

AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
TELA DI RAGNO	<i>Cladobotryum dendroides</i>		<u>Interventi agronomici:</u> - isolare dall'ambiente esterno le stanze di coltivazione - filtrare l'aria, pulire e disinfettare i locali di coltivazione e le attrezzature - abbattere la polvere durante le fasi di carico di composto e della terra di copertura - controllare i Ditteri - sterilizzare accuratamente le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione - curare l'igiene del personale.	Metrafenone				Aril-fenil-chetone	U					
MUFFA DEI FUNGHI COLTIVATI	<i>Trichoderma sp.</i>		<u>Interventi agronomici:</u> - selezionare le materie prime - eseguire un'accurata fermentazione e pastorizzazione del composto - isolare la sala semina - filtrare l'aria dei tunnel di pastorizzazione e incubazione - abbattere le polveri - sterilizzare accuratamente le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione - curare l'igiene del personale.	Bacillus amyloqueliciens				Microbici Bacillus sp	F6					
MACULATURA BATTERICA	<i>Pseudomonas sp.</i>		<u>Interventi agronomici:</u> - controllare l'umidità e la velocità dell'aria - eliminare gli sbalzi di temperatura - trattare l'acqua di inaffiatura con Cloro (Ipoclorito di sodio o cloruro di calcio) o Iodio (PVP 179).											
SCIARIDI			<u>Interventi agronomici:</u> - isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura - filtrare l'aria in entrata ed uscita - mantenere al fungaia libera da detriti organici di ogni tipo - sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.	Steinernema feltiae Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3	*			(*) Utilizzare formulati registrati sulla coltura	
CECIDOMIE	<i>Heteropeza pygmaea</i>		<u>Interventi agronomici:</u> - isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura - filtrare l'aria in entrata ed uscita - mantenere al fungaia libera da detriti organici di ogni tipo - sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.	Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3	*			(*) Utilizzare formulati registrati sulla coltura	
LIMACEE			<u>Interventi agronomici:</u> - isolare le stanze di coltivazione dall'ambiente esterno.	Ortofosfato di ferro						*			(*) Interventi a terra sulle parti laterali delle strutture di protezione	