AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
PATOGENI TELLURICI			Impiegare seme conciato.											
PERONOSPORA DELL' ARACHIDE	*Mycosphaerella berkeleyi*	Interventi chimici: - si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7 - 8 giorni.	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato.	***Prodotti rameici***	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni.	Non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno
ANTRACNOSI	*Ascochyta arachidis*	Interventi chimici: - si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7 - 8 giorni.	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato.	***Prodotti rameici***	SI			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni.	Non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno
MARCIUMI RADICALI	*Rhizoctonia* spp			*Trichoderma harzianum* ceppo ITEM 908	SI									