

AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincioli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
PERONOSPORA DELLA LATTUGA	<i>Bremia sp.</i>			Prodotti rameici Azoxystrobin	SI	Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni sulla coltura, si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	
RAMULARIA SPP.	<i>Ramularia sp.</i>			Prodotti rameici Pythium oligandrum CEPP0 M1	SI	Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni sulla coltura, si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	
MUFFA GRIGIA			Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno.									
OIDIO	<i>Leveillula sp.</i>			Zolfo	SI	Inorganici	M					
				Bicarbonato di potassio	SI							
				Azoxystrobin		Inibitori del chinone membri	C3		2			
SCLEROTINIA	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>			Fluxapyroxad + Pyraclostrobin					1			
BATTERI	<i>Erwinia carotovora subsp. carotovora</i>			Prodotti rameici Maltodestrine	SI	Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni sulla coltura, si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	
				Tau-fluvalinate	SI	Piretroidi e piretrine	3	2				
AFIDI				Sali potassici di acidi grassi	SI	Sali di potassio degli acidi grassi						
PIRALIDE DEL MAIS E DELLA CANAPA	<i>Ostrinia nubilalis</i>	Soglia di intervento: 6 - 10 mine / foglia.		Bacillus thuringiensis	SI							
VANESSA DEL CARDO	<i>Vanessa cardui</i>	Soglia di intervento: 6 - 10 mine / foglia.		Bacillus thuringiensis	SI							
DEPRESSARIA	<i>Depressaria sp.</i>	Soglia di intervento: 6 - 10 mine / foglia.		Bacillus thuringiensis	SI							
CASSIDA DEL CARCIOFO	<i>Cassida defforata</i>											
PUNTERUOLI	<i>Larinus cynarae</i>											
MOSCA MINATRICE	<i>Agromyza sp.</i>											
ALTICA DEI CARDI	<i>Sphaeroderma rubidum</i>											
ELATERIDI E ALTRI INSETTI TERRICOLI	<i>Agriotes spp., Agrotis spp., e altri</i>	Soglia di intervento: presenza.	soltanto in presenza dell'infestazione	Tefuthrin		Piretroidi e piretrine	3				Ammessi formulati geodisinfestanti con concentrazione di s.a. di 0,5%	
NOTTUE FOGLIARI	<i>Spodoptera spp.</i>			Tau-fluvalinate		Piretroidi e piretrine	3	2				
LUMACHE		Trattamenti localizzati		Metaldeide esca								
				Ortofosfato di ferro	SI							
RODITORI				Fosforo di zinco		Composti inorganici	24A					