

AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
PERONOSPORA	<i>Plasmopara spp</i>		Interventi agronomici: ricorso ad ecotipi resistenti											
OIDIO	<i>Oidium</i>		Interventi agronomici: la malattia può comparire in particolare areali e su ecotipi sensibili	Zolfo Fluxapiraxad	SI			Inorganici Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	M C2		2			
MORIA PIANTINE	<i>Pythium spp</i>		Trattamento al suolo prima o dopo la semina, da incorporare nel terreno. In fase vegetativa trattare su suolo umido	<i>Trichoderma atroviride</i>	SI	SI		Microbici	BM02					
ELATERIDI	<i>Agriotes sp</i>			Tefluthrin		SI		Piretroidi Piretrine	3A				va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati. Solo pieno campo	
AFIDI			Intervenire all'inizio dell'infestazione	Sali potassici di acidi grassi	SI		SI						Autorizzato solo in serra	