AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
CARBONE VOLANTE DEL FRUMENTO	*Ustilago tritici*												
CARIE DEL GRANO	*Tilletia sp.*												
FUSARIOSI DEI CEREALI	*Fusarium spp.*	Interventi con fungicidi chimici previsti solo per le Regioni del Centro Nord in numero di 2 indipendentemente dall'avversità.	*Pythium oligandrum*	SI									
			Bicarbonato di K	SI									
			Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QoI	C3	2				
			Tetraconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1		2			
		Sono ammessi al massimo 2 candidati alla sostituzione indipendente dall'avversità	Protioconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Difenoconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Bromuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Tebuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Metconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
NERUME DEI CEREALI	*Alternaria sp; Cladosporium sp; Epicoccum sp;altri.*												
OIDIO DEL FRUMENTO	*Blumeria graminis*	Interventi con fungicidi chimici previsti solo per le Regioni del Centro Nord in numero di 2 indipendentemente dall'avversità	Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QoI	C3		2			
			Azoxystrobin				inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
		Sono ammessi al massimo 2 candidati alla sotituzione indipendente dall'avversità	Bixafen				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2		1			
			Fluxapyroxad				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2					
			Tebuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Mefentrifluconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
		Soglia di intervento: - 10-12 pustole uniformemente distribuite sulle ultime 2 foglie.	**Metconazolo**				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Protioconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Bromuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Tetraconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Laminarina	SI									
			Zolfo	SI			inorganici	M					
			Fenpropidin				Ammine - morfoline IBE-Classe II	G2					
			Spiroxamina				Ammine - morfoline IBE-Classe II	G2	1				
RUGGINI	*Puccinia sp.*	Interventi con fungicidi chimici previsti solo per le Regioni del Centro Nord in numero di 2 indipendentemente dall'avversità.	Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QoI	C3		2			
			Azoxystrobin				inibitori del chinone membrana esterna QoI	C3					
			Fenpicoxamid				inibitori del chinone membrana interna QiI	C4	1			Non ammesso per ruggine nera (Puccinia graminis)	
		Soglia vincolante d'intervento: - comparsa uredosori sulle ultime 2 foglie.	**Metconazolo**				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Difenoconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Tebuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
		Sono ammessi al massimo 2 candidati alla sotituzione indipendente dall'avversità	Mefentrifluconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1		2			
			Protioconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Bromuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Tetraconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Bixafen				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2					
			Benzovindiflupyr				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2		1			
			Fluxapyroxad				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2					
			Fenpropidin				Ammine - morfoline IBE-Classe II	G2					
COMPLESSO DELLA SEPTORIOSI FOGLIARE DEL FRUMENTO	*Staganospora sp; Septoria sp.*	Interventi fungicidi previsti solo per le Regioni del Centro Nord in numero di 2 indipendentemente dall'avversità.	*Pythium oligandrum*	SI									
			Laminarina	SI									
			Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QoI	C3		2			
			Azoxystrobin				inibitori del chinone membrana esterna QoI	C3					
			Fenpicoxamid				inibitori del chinone membrana interna QiI	C4	1				
		Sono ammessi al massimo 2 candidati alla sotituzione indipendente dall'avversità	**Difenoconazolo**				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Tebuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Mefentrifluconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1		2			
			Metconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Protioconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Tetraconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Bromuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
			Benzovindiflupyr				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2					
			Bixafen				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2		1			
			Fluxapyroxad				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2					
			Folpet				Ftalimmidi	M	1			Non distribuire oltre la fase di foglia a bandiera	
			Fenpropidin				Ammine - morfoline IBE-Classe II	G2		1			
AFIDE DEI CEREALI	*Metopolophium dirhodum; Rhopalosiphum padi; Sitobion avenae; altri.*	Non ammessa la concia con insetticidi.	Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3A					Prima di eseguire l'intervento valutare la presenza, l'entità dei limitatori naturali e la loro potenziale capacità nel contenimento dello sviluppo della popolazione del fitofago
		Soglia di intervento: - 80% di culmi con afidi.	*Sali potassici di acidi grassi*	SI									