AVVERSITA'	NOME LATINO	CRITERI DI INTERVENTO: vincoli	CRITERI DI INTERVENTO: consigli	Sostanza attiva	Bio	pieno campo	coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1)	(2)	(3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
OIDIO DEL FRUMENTO	*Blumeria graminis*													
RUGGINI	*Puccinia sp.*													
CARBONE VOLANTE DELL'ORZO	*Ustilago segetum var. nuda*													
ELMINTOSPORIOSI DELL'ORZO (MACCHIE RETICOLATE, MACULATURA E STRIATURA FOGLIARE)	*Pyrenophora graminea (sinonimi: Drechslera graminea, Helminthosporium grameneum)* *Pyrenophora teres (sinonimi: Drechslera teres, Helminthosporium teres)* *Bipolaris sorokiniana (sinonimi Cochliobulus sativus, Drechslera sorokiniana, Helminthosporium sativum)*	Ammesso un solo intervento sulla coltura e massimo un candidato alla sostituzione. <u>Soglia di intervento</u>: presenza di sintomi	Interventi agronomici: - evitare i ristoppi - varietà resistenti - semine ritardate - concimazioni azotate equilibrate	*Laminarina*	SI								Ammessa solo in miscela	
				Pyraclostrobin				inibitori del chinone membrana esterna QoI	C3					
				Azoxystrobin				inibitori del chinone membrana esterna QoI	C3					
				Bixafen				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2					
				Fluxapyroxad				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2					
				Benzovindiflupyr				SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi	C2					
				Tebuconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
				Protioconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
				Mefentrifluconazolo				DMI - inibitori di demetilazione - IBE Classe I	G1					
				Spiroxamina				Ammine - morfoline IBE-Classe II	G2					
VIROSI			<u>Interventi agronomici</u> - evitare i ristopp - varietà resistenti.											
VIRUS DEL NANISMO GIALLO			<u>Interventi agronomici</u> - semine ritardate.											
AFIDI	*Metopolophium dirhodum; Rhopalosiphum padi; Sitobion avenae ed altri.*		<u>Interventi agronomici</u> - favorire semine tardive e non troppo fitte - limitare le concimazioni azotate Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo.											