

**Controllo Integrato delle infestanti del Pistacchio**

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Allevamento e produzione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali.
		Graminacee	Quizalofop-p-etile Propaquizafop	
Allevamento e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Isoxaben (2) Oryzalin (2)	(2) Max 5 l/ha in allevamento da dormienza a fine fioritura. Applicare in banda sotto la fila al massimo sul 30% della superficie.

**Non ammessi interventi chimici nelle interfile**  
**(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.**  
**Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).**

**Interventi agronomici:**  
 Effettuare inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno.

**Interventi chimici:**  
 L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:  
 - vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)  
 - vi siano impianti con impalcature basse e dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.