Controllo Integrato delle infestanti di: Finocchio

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVE | NOTE |
|---|---|---|---|
| Pre semina<br>Pre trapianto | Dicotiledoni e Graminacee | Glifosate (1) | **(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.** |
| | | Acido Pelargonico | |
| | Dicotiledoni | Metobromuron | **Solo su colture per la produzione di sementi** |
| Pre trapianto e pre emergenza | Dicotiledoni e Graminacee | **Pendimethalin (*)** (3) | (3) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione |
| | | Clomazone (2) | (2) Da utilizzare subito dopo la semina |
| | Dicotiledoni | **Aclonifen (*)** | |
| Post emergenza | Dicotiledoni | **Metribuzin (*)** | |
| Post trapianto | Dicotiledoni e Graminacee | **Pendimethalin (*)** (3) | (3) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione |
| | Graminacee | Propaquizafop<br>Fluazifop-p-butile | |
| Diserbo interfila | Graminacee e dicotiledoni | Acido pelargonico | |

**(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

**Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.**

**Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.**

**Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.**

**Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.**

**(2) Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall'epoca**