

Controllo Integrato delle infestanti di: Mais dolce

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVE	NOTE
Pre semina		Glifosate (1) Acido Pelargonico	<b>(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.</b>
Post emergenza		<b>Tembotrione (*)</b> + Isoxadifen-ethyl Piridate	
Pre e post emergenza		Mesotrione	
Diserbo interfila	Graminacee e dicotiledoni	Acido pelargonico	
<p><b>(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree</b>                      Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.                      Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.                      Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.                      Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.</p>			
<p><b>(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 1.</b>                      Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)</p>			