

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE	
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.	
		Acido pelargonico		
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Triallate (*) (2)	Il diserbo di pre-emergenza di frumento ed orzo è consentito una volta ogni 2 3 anni sullo stesso appezzamento. Tale pratica è alternativa al diserbo di post emergenza precoce	
		Flufenacet (*) (3)	(2) graminicida	
		Pendimetalin (*) (3)	(3) Non impiegabile su frumento se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente	
		Prosulfocarb	(4) dicotiledonica con azione secondaria su graminacee	
		Diflufenican (*) (4)	(5) Dicotiledonica	
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Bifenox (5) (6)	Il diserbo di post emergenza precoce è alternativo a quello di pre emergenza	
		Prosulfocarb		(5) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato
		Flufenacet (*) (3)		(3) Non impiegabile su frumento se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente
		Diflufenican (*) (4)		(4) dicotiledonica con azione secondaria su graminacee
		Beflubutamid		(7) Non efficace su Lolium
Post emergenza	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile (7)	(7) Non efficace su Lolium	
		Pinoxaden		
		Diclofop-metile (*)		
		Clodinafop		
	Dicotiledoni	Tifensulfuron - metile	(5) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato	
		Metsulfuron metile (*)		
		Tribenuron-metile		
		Mecoprop-P		
		Diclorprop-p		
		Tritosulfuron		
		Fluroxipyr		
		Florasulam		
		Amidosulfuron		
		Aminopyralid		
		2,4-D		
		MCPA		
	Graminacee e Dicotiledoni	Bifenox (5)	(4) dicotiledonica con azione secondaria su graminacee.	
		Diflufenican (*) (8) (4)	(8) Impiego alternativo al diserbo di pre-emergenza/post emergenza precoce	
		Clopiralid		
		Halaoxifen-metile		
Graminacee e Dicotiledoni	Iodosulfuron metil-sodium			
	Thiencarbazone			
	Bensulfuron metile			
	Mesosulfuron-metile			
	Propoxycarbazone-sodium			
		Pyroxsulam		
<b>(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree</b>				
Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.				
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.				
Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.				
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.				
<b>(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 4.</b>				
Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)				