

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE	
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.	
		Acido pelargonico		
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Triallate (*) (2)	Il diserbo di pre-emergenza dell'orzo è consentito una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento. Tale pratica è alternativa al diserbo di post emergenza precoce	
		Flufenacet (*) (3)	(2) graminicida	
		Pendimetalin (*) (3)	(3) Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente	
		Prosulfocarb		
		Diflufenican (*) (4)	(4) dicotiledonica con azione secondaria su graminacee	
		Bifenox (5) (6)	(5) Dicotiledonica	
		(6) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato		
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Bifenox (5) (6)	Il diserbo di post emergenza precoce è alternativo a quello di pre emergenza	
		Prosulfocarb		(5) dicotiledonica
		Flufenacet (*) (3)		(6) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato
		Diflufenican (*) (4)		(3) Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente
		Beflubutamid		(4) dicotiledonica con azione secondaria su graminacee
Post emergenza	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile (7)	(7) Non efficace su Lolium	
		Pinoxaden		
		Diclofop-metile (*)		
	Dicotiledoni	Tifensulfuron - metile	(4) dicotiledonica con azione secondaria su graminacee	
		Metsulfuron metile (*)		
		Tribenuron-metile		
		Mecoprop-P		
		Diclorprop-p		
		Tritosulfuron		
		Fluroxipyr		
		Florasulam		
		Aminopyralid		
		2,4-D		
		MCPA		
		Diflufenican (*) (4) (8)		
		Bifenox (6)		
		Clopiralid		
		Halaoxifen-metile		
Graminacee e Dicotiledoni	Iodosulfuron metil-sodium	(8) Impiego alternativo al diserbo di pre-emergenza/post emergenza precoce		
	Bensulfuron metile			

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 4.

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)