FVG_DIFESA Riso 2024														
Avversità	**Nome latino**	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**Bio**	**Pieno campo**	**Coltura protetta**	**Gruppo chimico**	**Codice gruppo chimico**	**(1) numero max trattamenti singolo principio attivo**	**(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo**	**Informazioni aggiuntive**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
FUSARIOSI	*Fusarium spp.*	Interventi chimici: - ammessa solo la concia del seme.												
ELMINTOSPORIOSI	*Drechslera oryzae*	Interventi chimici: - interventi ammessi nella fase tra piena botticella e fine spigatura.		Azoxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3		2			
				Trifloxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Piraclostrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
BRUSONE DEL RISO	*Pyricularia oryzae*		Interventi chimici: - si consiglia di intervenire nei terreni sciolti tra la fase di botticella e la spigatura al verificarsi delle condizioni idonee alle infezioni: - bagnatura da pioggia o rugiada di almeno 12 ore - temperatura superiore a 24° C - umidità relativa dell'aria superiore al 90% - interventi ammessi nella fase tra piena botticella e fine spigatura. Interventi agronomici: - fare uso di varietà tolleranti - evitare somministrazioni eccessive di azoto - evitare semine troppo ritardate - evitare semine troppo fitte.	*Bacillus subtilis*	Si			Microbici Bacillus sp.	F6					
				COS-OGA	Si									
				Zolfo	Si			Inorganici	M					
				Azoxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3		2		Sulla coltura è ammesso solo 1 intervento anticrittogamico all'anno sulle varietà meno sensibili. Sulle varietà sensibili è ammesso un secondo trattamento con una s.a. diversa da quella impiegata nel primo trattamento. Non aprire le bocchette di uscita per 7 giorni a partire dal trattamento.	
				Trifloxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Piraclostrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Difenoconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	1				
COPPETTA DEL RISO	*Triops cancriformis*	Non sono ammessi interventi chimici.	Interventi agronomici: - asciutta.											
DITTERI CHIRONOMIDI	*Chironomus spp.; Cricotopus spp.*	Non sono ammessi interventi chimici.	Interventi agronomici: - asciutta.											
DITTERI EFIDRIDI	*Hydrellia griseola*	Non sono ammessi interventi chimici.	Interventi agronomici: - asciutta.											
PUNTERUOLO ACQUATICO DEL RISO	*Lissorhoptrus oryzophilus*		Interventi agronomici: - asciutta - pulizia degli argini.	**Lambda-cialotrina**				Piretroidi e piretrine	3A	1			Impiegare su non più del 50% della superficie aziendale. Ammesso un solo trattamento tra lambda-cialotrina e clorantraniliprole.	Ammessa la concia del seme.
				Clorantraniliprole				Diamidi	28	1			Impiegare su non più del 50% della superficie aziendale. Ammesso un solo trattamento tra lambda-cialotrina e clorantraniliprole.	
VERMI DI RISAIA		Non sono ammessi interventi chimici.	Interventi agronomici: - asciutta.											