| FVG_DIFESA Orzo da seme 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avversità** | **Nome latino** | **Criteri di intervento: vincoli** | **Criteri di intervento: consigli** | **Sostanza attiva** | **Bio** | **Pieno campo** | **Coltura protetta** | **Gruppo chimico** | **Codice gruppo chimico** | **(1) numero max trattamenti singolo principio attivo** | **(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo** | **Informazioni aggiuntive** | **Limitazioni d'uso e note** | **Limitazioni d'uso per avversità** |
| **OIDIO DEL FRUMENTO** | *Blumeria graminis* | | | | | | | | | | | | | |
| **RUGGINE** | *Puccinia spp.* | | | | | | | | | | | | | |
| **CARBONE VOLANTE DELL'ORZO** | *Ustilago segetum var. nuda* | | | | | | | | | | | | | |
| **ELMINTOSPORIOSI DELL'ORZO (MACCHIE RETICOLATE, MACULATURA E STRIATURA FOGLIARE)** | *Pyrenophora graminea (sinonimi: Drechslera graminea, Helminthosporium gramineum); Bipolaris sorokiniana (sinonimi Cochliobulus sativus, Drechslera sorokiniana, Helminthosporium sativum); Pyrenophora teres (sinonimi: Drechslera teres, Helminthosporium teres)* | Ammesso un solo intervento sulla coltura e massimo un candidato alla sostituzione.<br><br>Soglia di intervento: presenza di sintomi | Interventi agronomici:<br>- evitare i ristoppi<br>- varietà resistenti<br>- semine ritardate<br>- concimazioni azotate equilibrate | *Laminarina* | Si | | | Composto naturale | P4 | | | | | |
| | | | | Pyraclostrobin | | | | Inibitori del chinone membrana esterna QOI | C3 | | | | | |
| | | | | Azoxystrobin | | | | Inibitori del chinone membrana esterna QOI | C3 | | | | | |
| | | | | Bixafen | | | | Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI | C2 | | | | | |
| | | | | Fluxapyroxad | | | | Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI | C2 | | | | | |
| | | | | **Benzovindiflupyr** | | | | SDHI - Inibitori Succinato deidrogenasi | 7 | | | | Ammesso solo per Pyrenophora Teres | |
| | | | | **Tebuconazolo** | | | | DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I | G1 | | | | | |
| | | | | Protioconazolo | | | | DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I | G1 | | | | | |
| | | | | Mefentrifluconazolo | | | | | | | | | | |
| | | | | Spiroxamina | | | | Ammine - morfoline IBE-Classe II | G2 | | | | | |
| **VIROSI** | | | Interventi agronomici:<br>- evitare i ristoppi<br>- varietà resistenti. | | | | | | | | | | | |
| **VIRUS DEL NANISMO GIALLO** | | | Interventi agronomici:<br>- semine ritardate. | | | | | | | | | | | |
| **AFIDI** | | | Interventi agronomici:<br>- favorire semine tardive non troppo fitte<br>- limitare le concimazioni azotate.<br>Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo. | | | | | | | | | | | |