

Controllo Integrato delle infestanti di: Avena Segale Triticale_rev

Controllo integrato delle infestanti Avena Segale Triticale FVG 2024

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Prosulfocarb (2)	Il diserbo di pre-emergenza di avena, segale e triticale è consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. Tale pratica è alternativa al diserbo di post emergenza precoce
		Flufenacet* (2) Pendimetalin*	(2) Non ammesso su avena
		Diflufenican* (3)	(3) dicotiledonica con azione secondaria su graminacee
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Flufenacet* (2) Beflubutamid(2) Prosulfocarb (2)	Il diserbo di post emergenza precoce è alternativo al diserbo di pre emergenza (2) Non ammesso su avena
		Halaxifen methyl Fluroxipir-meptil	
		Pendimetalin*	
		Diflufenican* (3)	(3) dicotiledonica con azione secondaria su graminacee
Post-emergenza	Graminacee	Pinoxaden (8)	(8) Ammesso su triticale.
		Clodinafop (2)	(2) Non ammesso su avena
	Dicotiledoni	Mecoprop-P	
		Amidosulfuron (4)	(2) Non ammesso su avena
		Clopiralid	(4) Da solo impiegabile esclusivamente su segale ed avena
		Florasulam (5)	(5) Da solo non ammesso su avena
		Aminopyralid (2)	
		2,4-D	
		MCPA	
		Diclorprop-p	
		Tifensulfuron - metile	
		Tribenuron-metile	
		Tritosulfuron	
		Metsulfuron-metile*	
		Bifenox (6)	(6) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato
Halaxifen-metile Fluroxipir-meptil			
	Iodosulfuron metil-sodium (2) Pyroxsulam (2)	(2) Non ammesso su avena	

Controllo Integrato delle infestanti di: Avena Segale Triticale_rev

	Graminacee e Dicotiledoni	Mesosulfuron-metile (2)	
		Propoxycarbazone-sodium (6)	(4) dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee
		Diffenican* (4) (7)	(7) Impiego alternativo al pre-emergenza

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ L/ha} \times n$. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 2.

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)