

Controllo Integrato delle infestanti di: Mais_rev

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido Pelargonico (10)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. (10) Diserbo letti di semina.
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	<p>Per il mais, a partire dal 2024, se previsti gli interventi erbicidi di pre-emergenza devono essere realizzati con la tecnica del diserbo localizzato sulla fila. In alternativa al diserbo localizzato sono ammessi gli interventi erbicidi di pre-emergenza al massimo sul 50% della SAU investita a mais.</p> Terbutilazina (2)(3)(4) Pendimetalin (*) Isoxaflutole (5) Thiencarbazone-methyl (6) Pethoxamide Aclonifen (*) Clomazone Flufenacet (*) Dimetenamide-P S-Metolaclor (11) Mesotrione Sulcotrione (*)	Fare attenzione allo sviluppo di infestanti resistenti. (2) In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. (3) Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. (4) Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. (5) Impiegabile solo in pre o post emergenza. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon. (6) Al massimo 1 intervento all'anno. (11) Sostanza attiva revocata. Data ultima di impiego 23/07/2024.
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina (2)(3)(4) Pendimetalin (*) Isoxaflutole (5) Dimetenamide-P Thiencarbazone-methyl (6) Tembotrione (*) S-Metolaclor (7) (11) Clomazone Mesotrione	(2) In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. (3) Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. (4) Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. (5) Impiegabile solo in pre o post emergenza. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon. (6) Al massimo 1 intervento all'anno. (7) Impiegabile localizzato sulla fila di semina o sul 50% della superficie a mais. Oppure impiegabile in post emergenza max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente che venga applicato su barbabietola da zucchero, mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia. (11) Sostanza attiva revocata. Data ultima di impiego 23/07/2024.

