

Controllo integrato delle infestanti del Tabacco FVG 2024

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre trapianto (Interrato)	Graminacee e Dicotiledoni annuali	Napropamide (1)	(1) Non controlla <i>Solanum nigrum</i>
Pre trapianto (in superficie localizzato sulla fila)	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen (*) (2) Pendimetalin (*) Etofumesate Metobromuron Acido Pelargonico (**) (3)	(2) sullo stesso appezzamento 1 intervento ogni 2 anni (3) Diserbo letti di semina.
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone	
Post emergenza	Dicotiledoni	Piridate (4)	(4) Al max 1 kg all'anno di formulato commerciale
	Graminacee	Propaquizafop Fluazifop-p-butile Quizalofop-p-etile	

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le s.a. candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 2
Nel caso di impiego di miscele contenenti più s.a. candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate
(ad es., una miscela con 2 s.a. cs vale per 2 interventi)

(**) L'acido pelargonico è utilizzabile anche per il trattamento dei germogli ascellari