

**Controllo Integrato delle infestanti delle Pomacee (Melo, Pero e Cotogno) FVG 2024**

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Produzione	Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Acido pelargonico Glifosate (1)	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. <b>(1) Max 9 L/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; max 6 L/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione</b>
		Dicotiledoni	Carfentrazone (2)	<b>(2) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha come spollonante.</b>
			Acido pelargonico (3) Pyraflufen ethyle Fluroxypir (4) MCPA (5)	<b>(3) Come spollonante</b>
				<b>(4) Al massimo 1 applicazione</b> <b>(5) Impiegabile in alternativa a 2,4 D</b>
		Graminacee	Ciclossidim Fluazifop-p-butile Quizalofop-p-etile Propaquizafop Clethodim	
	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate(1) 2,4D (6)(9)	<b>(6) Impiegabile in alternativa a MCPA e al massimo 1 intervento</b> <b>(9) solo in miscela con glifosate</b>	
	Dicotiledoni	Isoxaben (7)	<b>Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)</b> <b>(7) a fine inverno fino alla fioritura. Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)</b>	
	Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	<b>Oxifluorfen (*) (8)</b> <b>Pendimetalin (*) (8)</b> <b>Diflufenican (*) (8)</b> <b>Propyzamide (*) (8)</b>	<b>(8) Utilizzabili in produzione al max sul 30% della superficie e solo per un intervento; nell'impiego in produzione pendimetalin, diflufenican, oxyfluorfen e propyzamide sono in alternativa tra di loro</b>
Allevamento (fino a 3 anni)	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1)	<b>(1) Max 9 L/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; max 6 L/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione</b>
		Graminacee	Clethodim	
		Dicotiledoni	Isoxaben (7)	<b>Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)</b> <b>(7) a fine inverno fino alla fioritura. Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)</b>
	Residuale		<b>Oxifluorfen (*) (8)</b>	<b>(8) Utilizzabili in produzione al max sul 30% della superficie e solo per un intervento</b>

**Non ammessi interventi chimici nelle interfile**

**Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura.**

**Non ammessi:**

**- Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione**

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2
- Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per il pero )
- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.