

Controllo integrato delle infestanti della Rapa e del Rafano FVG 2024

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido Pelargonico (2)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. (2) Diserbo letti di semina.
Post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Acido Pelargonico (3)	(3) Diserbo localizzato nell'interfila con attrezzature schermate.
	Graminacee	Fluazifop-p-butile (4) Cletodin	(4) Verificare la registrazione in etichetta per l'impiego su rafano.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ L/ha} \times n$. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.