

Controllo Integrato delle infestanti di: FVG DISERBO Mais_25_V2

DISERBO Mais FVG 2025 V2									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli cultura	Consigli cultura	Informazioni aggiuntive
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico		Diserbo letti di semina.					
		Glifosate		<p>Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree</p> <p>Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.</p> <p>Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.</p> <p>Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.</p>					
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina	4	In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.		Fare attenzione allo sviluppo di infestanti resistenti. Per il mais, a partire dal 2024, se previsti gli interventi erbicidi di pre-emergenza devono essere realizzati con la tecnica del diserbo localizzato sulla fila. In alternativa al diserbo localizzato sono ammessi gli interventi erbicidi di pre-emergenza al massimo sul 50% della SAU investita a mais			
		Pendimethalin							
		Isoxaflutole		Impiegabile solo in pre o post emergenza. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon.					
		Thiencarbazono methyl		Al massimo 1 intervento all'anno.					
		Pethoxamide							
		Aclonifen							
		Clomazone							
		Flufenacet							
		Dimetenamide-P							
		Mesotrione							
Sulcotrione									
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina	4	In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.		I trattamenti in post emergenza precoce sono alternativi a quelli in pre-emergenza.			
		Pendimethalin							
		Isoxaflutole		Impiegabile solo in pre o post emergenza. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon.					
		Dimetenamide-P							
		Thiencarbazono methyl		Al massimo 1 intervento all'anno.					
		Tembotrione							

Controllo Integrato delle infestanti di: FVG DISERBO Mais_25_V2

		Clomazone					
		Mesotrione					
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron					
		Nicosulfuron					
		Terbutilazina	In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.				
		Mesotrione					
		Tembotrione					
		Foramsulfuron					
		Thiencarbazone methyl	Al massimo 1 intervento all'anno.				
		Sulcotrione					
		Tifensulfuron - metile					
	Dicotiledoni	Tritosulfuron	S.a. revocata. Scadenza utilizzo in campo 07/11/2025.				
		Clopiralid					
		Dicamba					
		Fluroxipir					
		Florasulam					
		Prosulfuron	Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.				
		Piridate					
	2,4 D	Al massimo sul 10% della superficie aziendale investita a mais. In alternativa al MCPA					
Dicotiledoni e Ciperacee	Halosulfuron-metile						
Dicotiledoni perenni	MCPA	Al massimo sul 10% della superficie aziendale investita a mais. In alternativa al 2,4 D					