

DISERBO Tabacco FVG 2025 v1

Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre trapianto (interrato)	Graminacee e Dicotiledoni annuali	Napropamide	2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Non controlla Solanum nigrum					
Pre trapianto (in superficie localizzato sulla fila)	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen		Sullo stesso appezzamento 1 intervento ogni 2 anni					
		Pendimethalin							
		Ethofumesate		Sullo stesso appezzamento 1 intervento ogni 2 anni					
		Metobromuron		Sullo stesso appezzamento 1 intervento ogni 2 anni					
		Acido pelargonico		Diserbo letti di semina. L'acido pelargonico è utilizzabile anche per il trattamento dei germogli ascellari dopo la cimatura					
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone							
Post emergenza	Graminacee	Propaquizafop							
		Fluazifop-p-butile							
		Quizalofop-p-etile							
	Dicotiledoni	Piridate	Al massimo 1 kg. All'anno di formulato commerciale						