

DISERBO ARBOREE Nocciolo FVG 2025 V2														
Impianto Attività	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note attività - vincoli	Note attività - consigli	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive				
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimethalin	1 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi					Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura. È permesso un intervento chimico sull'intera superficie in pre-raccolta .	L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a metri 3,5 – 4; - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici. -vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%). Agronomico: operare con gli inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno.					
		Oxyfluorfen												
		Diflufenican												
		Glifosate		Da utilizzarsi entro la fioritura o dopo la raccolta. Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L . Max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione.										
		Flazasulfuron		Impiegabile su impianti in produzione.										
		Clomazone												
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Acido pelargonico												
		Glifosate		Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L; Max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione.										
	Graminacee	Quizalofop-p-etile												
		Propaquizafop												
		Fluazifop-p-butile												
		Clethodim												
	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen ethyle												
		Acido pelargonico	Come spollonante											
		Carfentrazone	Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 l/ha come spollonante.											
	PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Fluroxipir		Uso consentito anche come spollonante.									
			2,4 D											