

ersa



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

via Montesanto, 17

34170 Gorizia

Centralino 0481-3861 E-mail ersa@ersa.fvg.it

Posta certificata: ersa@certregione.fvg.it

Codice fiscale e partita IVA 00485650311

Pozzuolo del Friuli, li 25 giugno 2020

tel. 0432 529211

fax. 0432 529273

0432 529202

e-mail: fitosanitario@ersa.fvg.it

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica

Prot. n. SCS/4611-P/4.8.3.1

Agli operatori
del comparto viticolo
del Friuli Venezia Giulia
Loro sedi

A mezzo posta elettronica

Oggetto: indicazioni per il trattamento insetticida obbligatorio contro *Scaphoideus titanus*.

Come anticipato nella nota prot. n. 3943/SCS/4.8.3.1 dell'8 giugno 2020, relativa ai trattamenti insetticidi per la lotta obbligatoria a *Scaphoideus titanus*, insetto vettore della flavescenza dorata della vite, vengono fornite le indicazioni per l'effettuazione del trattamento obbligatorio.

Considerando la frequenza e l'evoluzione dei diversi stadi giovanili di *Scaphoideus titanus* in seguito al monitoraggio della fenologia dell'insetto in diverse località della Regione, il trattamento con i sottoelencati principi attivi: **acetamiprid, flupyradifurone, piretroidi (acrinatrina, beta-ciflutrin, cipermetrina, deltametrina, esfenvalerate, etofenprox lambda-cialotrina, tau-fluvalinate, zeta-cipermetrina), piretrine (piretro naturale)** dovrà essere eseguito

Dall' 1 al 10 luglio

Solo in particolari zone dove per caratteristiche climatiche lo sviluppo dell'insetto risulti più ritardato (areali più settentrionali della Regione, versanti meno esposti a sud), il trattamento potrà essere posticipato dal 5 al 15 luglio.

Servizi -----

Direzione Generale
34170 GORIZIA
Via del Monte Santo, 17
Tel. 0481-3861
Email: ersa@ersa.fvg.it
Pec. ersa@certregione.fvg.it
C.F./P.IVA 00485650311

Servizio Affari giuridici,
amministrativi, contabili e
generali
34170 GORIZIA
Via del Monte Santo, 17
Tel. 0481-3861

Servizio Statistica Agraria e
Coordinamento
delle attività nel settore dello
sviluppo rurale
33050 POZZUOLO del FRIULI
Via Sabbatini, 5
Tel. 0432.529211

Servizio Fitosanitario e chimico
ricerca, sperimentazione e
assistenza tecnica
33050 POZZUOLO del FRIULI
Via Sabbatini, 5
Tel. 0432.529211

Indicazioni più specifiche su tali zone potranno essere ricavate dalle comunicazioni di ERSA e dagli avvertimenti a cura dei consorzi DOC pubblicati sul sito.

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza nelle popolazioni dei fitofagi e per attenuare eventuali fenomeni di selezione dell'artropodofauna utile nei vigneti che potrebbero favorire pullulazioni di fitofagi secondari **si consiglia di alternare negli anni prodotti insetticidi con diverso meccanismo d'azione.**

Si consiglia di eseguire il trattamento all'interno del periodo indicato **tenendo conto delle caratteristiche climatiche degli appezzamenti**, preferendo i primi giorni per le aree più precoci e gli ultimi per gli areali più freddi e tardivi. Indicazioni più specifiche sulle singole aree potranno essere ricavate dagli avvertimenti pubblicati sul sito a cura dei consorzi DOC.

Per garantire la massima efficacia dell'intervento insetticida si raccomanda di **distribuire il prodotto su tutta la vegetazione, compresi i polloni e di utilizzare adeguati volumi di irrorazione.**

Si rammenta inoltre **l'obbligo dello sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di trattamento** (decreto n. 18 del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, del 25/03/2012) ai fini della salvaguardia del patrimonio apistico e dei pronubi in generale.

Si ribadisce che il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle etichette è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali, nonché minimizzare l'impatto sull'ambiente.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI PIRETRINE (ESTRATTO DI PIRETRO)

Unica sostanza attiva tra quelle indicate ammessa in agricoltura biologica, se impiegata è necessario eseguire un ulteriore trattamento con altri prodotti autorizzati in agricoltura biologica, come indicato nella circolare.

Essendo una sostanza attiva caratterizzata da bassa persistenza, si raccomanda di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili a massimizzarne l'attività:

- effettuare il trattamento preferibilmente nel tardo pomeriggio – sera o comunque non nelle ore centrali della giornata;
- evitare di usare acque eccessivamente alcaline ed eventualmente correggere il pH portandolo a valori di neutralità o subacidità;
- non impiegare assieme a prodotti (anticrittogamici, etc.) rameici, a reazione alcalina (poltiglia bordolese);

In presenza di elevate popolazioni dell'insetto considerare l'eventualità di eseguire il secondo trattamento obbligatorio con piretro, e di effettuare trattamenti supplementari con altri prodotti ad azione contro *Scaphoideus titanus*, come i Sali potassici di acidi grassi. Tali trattamenti supplementari devono comunque essere posizionati preferibilmente in anticipo rispetto all'intervento abbattente, in quanto sia il piretro che i sali potassici di acidi grassi presentano maggiore attività nei confronti degli stadi giovanili (1° - 3° stadio).

I tecnici del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica sono a disposizione per tutti i chiarimenti che venissero ritenuti necessari per la corretta applicazione delle norme di lotta obbligatoria, nonché per la lotta insetticida al vettore *Scaphoideus titanus*.
Si confida nella collaborazione dei destinatari della presente perché sia resa concreta un'azione di prevenzione e di controllo, vitale per il futuro della viticoltura e del vivaismo viticolo regionali.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore del Servizio
ing. Paolo Tonello