**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA DI LOTTA OBBLIGATORIA A *Scaphoideus titanus*
ANNO 2025 PER IL VIVAISMO VITICOLO (PIANTE MADRI PER MARZE – PIANTE MADRI PER PORTINNESTI - BARBATELLE)
nell'intero territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

TAB. 1 - SCHEMA DEGLI INTERVENTI

EPOCA DI INTERVENTO			
	Piante madri marze	Piante madri portinnesti	Barbatelle
1° intervento	In immediata pre fioritura della vite (orientativamente ultima decade di maggio)	Ultima decade di maggio	Ultima decade di giugno
2° intervento	Orientativamente gli ultimi giorni di giugno – primi di luglio	Orientativamente gli ultimi giorni di giugno – primi di luglio	Orientativamente entro fine luglio
3° intervento	Orientativamente fine luglio – primi di agosto		Orientativamente entro fine agosto

TAB. 2 - CARATTERISTICHE DEI PRINCIPI ATTIVI UTILIZZABILI

(*) le limitazioni di etichetta e l'intervallo di sicurezza possono variare in funzione del formulato commerciale impiegato

Principio attivo	Epoca di impiego 2025			Limitazioni da etichetta (*)	Caratteristiche	Intervallo di sicurezza (*)
	Piante madri marze	Piante madri portinnesti	Barbatelle			
Acetamiprid	1° intervento pre fioritura	1° intervento ultima decade di maggio. Attenzione: non tutti i formulati hanno la registrazione su PMP	1° intervento ultima decade giugno solo per barbatelle non innestate	utilizzabile al massimo 2 volte all'anno su impianti vivaistici dove non viene raccolta l'uva, 1 su quelli dove si raccoglie l'uva	Sistemico Efficace contro cicaline, cocciniglie, fillossera, ecc.	21 - 45 gg
Flupyradifurone	1° intervento pre fioritura	1° intervento ultima decade di maggio	1° intervento ultima decade giugno solo per barbatelle non innestate	utilizzabile al massimo 1 volta all'anno	Sistemico Efficace contro cicaline, fillossera, cocciniglia farinosa.	14 gg
Sulfoxaflor (Autorizzazione per emergenza fitosanitaria su vite da vino dal 01/05/2025 al 28/08/2025)	2° intervento fine giugno – inizio luglio,	(Non registrato)	1° intervento solo su varietà di uva da vino e da tavola	utilizzabile al massimo 1 volta all'anno (anche suddiviso in due applicazioni)	Sistemico Efficace contro cicaline, cocciniglie. Pericoloso per api e pronubi. Il trattamento dovrebbe essere eseguito nelle ore che precedono o seguono la piena attività delle api.	7 gg
PIRETROIDI						
Cipermetrina	2° - 3° intervento		2° - 3° intervento	Al massimo 1 intervento/anno	Azione per contatto / ingestione, efficaci contro cicaline; Non rispettosi per artropodi utili e fitoseidi, possono causare pullulazioni di acari; Con l'eccezione del tau-fluvalinate risultano non rispettosi e generalmente tossici per api e pronubi.	21 gg
Deltametrina	2° - 3° intervento	2° intervento	2° - 3° intervento	Al massimo 2 - 3 interventi/anno		3 - 7 o 15 gg
Esfenvalerate	2° - 3° intervento	2° intervento	2° - 3° intervento	Al massimo 2 interventi/anno		14 gg
Etofenprox	2° - 3° intervento	2° intervento	2° - 3° intervento	Al massimo 2 interventi/anno		21 gg
Lambda-cialotrina	2° - 3° intervento		2° - 3° intervento	Al massimo 1 - 2 interventi/anno		9 - 21 gg

Tau-fluvalinate	2° - 3° intervento	2° intervento	2° - 3° intervento	Al massimo 2 interventi/anno		21 gg
Piretrine (Piretro Naturale)	1° - 2° - 3° intervento	1° - 2° - 3° intervento	1° - 2° - 3° intervento	Impiegabile in agricoltura biologica	Prodotto poco persistente, necessita di accorgimenti per massimizzare l'efficacia Tossico per gli insetti utili	1 - 2 - 3 - 7 gg