

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 10 del 11 giugno 2009

INFORMAZIONI GENERALI

Il 20 febbraio 2009 il Comitato Produzione Integrata operante presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di conformità delle “Norme tecniche di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria delle colture e controllo delle infestanti” per l’anno 2009.

Il testo delle schede di coltura è consultabile sul sito dell’ERSA nella sezione “Avvertimenti e segnalazioni fitosanitarie” (<http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria>).


OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

Giovedì 11 giugno. Su tutta la regione avremo nuvolosità variabile con la possibilità di qualche rovescio o temporale sparso, più probabile sulle zone orientali ed in montagna, ma possibile anche su pianura e costa nel pomeriggio. Sulla costa soffierà Libeccio moderato ma in serata entrerà Bora moderata.

Venerdì 12 giugno. Sulla regione al mattino avremo cielo in prevalenza sereno sulla fascia occidentale, poco nuvoloso su quella orientale. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione. Sulla costa di primo mattino soffierà Borino che presto girerà in brezza.

Sabato 13 giugno. Tendenza: Sabato avremo cielo sereno al mattino con Borino sulla costa, poco nuvoloso o variabile nel pomeriggio. Domenica avremo in prevalenza bel tempo con caldo afoso ma nel pomeriggio sulle Alpi potrebbe formarsi della nuvolosità.

Per mettere in evidenza la quantità di pioggia caduta nell’ultima settimana, si riporta la distribuzione regionale come pubblicata sul sito www.isloprada.eu (elaborazione ARPA-OSMER)



FENOLOGIA

Le varietà precoci stanno raggiungendo la fase di pre-chiusura grappolo (BBCH 75) e le tardive hanno superato invece la fase di grano di pepe (BBCH 72).

DIFESA CRITTOGAME

Peronospora – La situazione è tranquilla su tutta la regione e non ci sono segnalazioni di comparsa di macchie. Solo in alcuni vigneti testimone sono comparse le prime infezioni ad inizio settimana. Negli ultimi sette giorni si sono verificate quotidianamente, su quasi tutto il territorio regionale (vedi figura), piogge abbondanti che possono aver dato avvio a una serie di infezioni.

Oidio – Al pari della peronospora, non ci sono segnalazioni di focolai d'infezione oidica; in ogni caso nella stante fase fenologica di pre-chiusura grappolo, la pianta è particolarmente sensibile a questa patologia ed è quindi importante mantenere un controllo serrato.

Si consiglia perciò di intervenire entro sabato 13 giugno con:

PERONOSPORA

benalaxil, benalaxil-M, bentiavalicarb, fluopicolide, iprovalicarb, metalaxil*, metalaxil-M

OIDIO

bupirimate, IBS, metrafenone, proquinazid*, quinoxifen, strobilurine.

DIFESA INSETTI

Tignole – è iniziato il secondo volo delle tignole tra il 4 e il 6 giugno. Nel caso si vogliano utilizzare i regolatori di crescita (IGR) si consiglia di intervenire dal 12 al 18 giugno.

Il *Bacillus thuringiensis* deve essere utilizzato in questi giorni ed è necessario ripetere il trattamento a distanza di 7-10 giorni. Il batterio agisce unicamente nel controllo delle tignole e non è efficace contro lo *Scaphoideus titanus*.

Chi intende abbinare la lotta alle tignole con il trattamento obbligatorio allo Scaphoideus titanus impiegando regolatori di crescita (IGR) deve intervenire nelle date indicate nella specifica circolare (<http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/comunicazioni-fitosanitarie/lotta-obbligatoria-contro-lo-scaphoideus-titanus>). Nel caso invece si voglia optare per prodotti abbattenti, in alternativa agli IGR, le modalità e le tempistiche d'intervento verranno specificate in uno dei prossimi avvertimenti.

N.B. Si raccomanda di rispettare le dosi ad ettolitro riportate in etichetta.

Si ricorda che devono passare almeno 2-3 ore dall'intervento senza pioggia per considerare efficace il trattamento.

In caso di grandinate intervenire entro 48 ore con rame o folpet*

*non ammesso nelle "Norme tecniche di produzione integrata"