

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 13 del 25 giugno 2009

INFORMAZIONI GENERALI

Il 20 febbraio 2009 il Comitato Produzione Integrata operante presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di conformità delle “Norme tecniche di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria delle colture e controllo delle infestanti” per l’anno 2009.

Il testo delle schede di coltura è consultabile sul sito dell’ERSA nella sezione “Avvertimenti e segnalazioni fitosanitarie” (<http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria>).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

Giovedì 25 giugno. Su tutta la regione cielo in prevalenza nuvoloso, anche se in giornata potrebbero esserci a tratti maggiori schiarite. Saranno comunque probabili locali piogge o rovesci, forse anche temporaleschi.

Venerdì 26 giugno. Su tutta la regione avremo tempo instabile con cielo da variabile a nuvoloso e la possibilità di rovesci sparsi e qualche temporale.

Sabato 27 giugno. Tendenza: Sabato avremo ancora tempo instabile con cielo da variabile a nuvoloso, possibili rovesci sparsi e qualche temporale.

FENOLOGIA

Tutte le varietà hanno superato la fase di chiusura grappolo (BBCH 77).

DIFESA CRITTOGAME

Peronospora – Nell’ultima settimana le condizioni di instabilità hanno creato i presupposti per lo sviluppo di nuove infezioni, e infatti sono comparse le prime macchie sulla nuova vegetazione. In questa fase fenologica non è da sottovalutare la possibilità di attacchi al grappolo. In relazione all’instabilità prevista per i prossimi giorni è necessario quindi garantire una buona protezione contro la malattia.

Oidio – Le segnalazioni di attacchi del fungo soprattutto su grappolo sono in aumento, segno che la pressione della malattia è elevata.

Si consiglia perciò di intervenire subito entro martedì 30 giugno con:

PERONOSPORA

cyazofamid, mandipropamid o zoxamide

OIDIO

zolfo bagnabile a dosi massime o zolfo in polvere nelle zone dove il fungo è storicamente presente

N.B. Si raccomanda di rispettare le dosi ad ettolitro riportate in etichetta.

Si ricorda che devono passare almeno 2-3 ore dall’intervento senza pioggia per considerare efficace il trattamento.

In caso di grandinate intervenire entro 48 ore con rame o folpet*

*non ammesso nelle “Norme tecniche di produzione integrata”