

## AVVERTIMENTO VITICOLO n. 9 del 3 giugno 2009

### INFORMAZIONI GENERALI

Il 20 febbraio 2009 il Comitato Produzione Integrata operante presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di conformità delle “Norme tecniche di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria delle colture e controllo delle infestanti” per l’anno 2009.

Il testo delle schede di coltura è consultabile sul sito dell’ERSA nella sezione “Avvertimenti e segnalazioni fitosanitarie” (<http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria>).

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

**Mercoledì 3 giugno.** Su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso con vento moderato da sud o sud-est sulla costa. Sulla zona montana sarà possibile maggiore variabilità al pomeriggio.

**Giovedì 4 giugno.** Su tutta la regione al mattino cielo in prevalenza coperto con rovesci temporaleschi, più probabili su pianura e costa orientale, poi in giornata miglioramento con schiarite anche ampie, ma saranno ancora possibili dei locali temporali. Sulla costa vento debole o moderato da nord-est.

**Venerdì 5 giugno.** Tendenza: Venerdì al mattino in prevalenza poco nuvoloso, nel pomeriggio peggioramento con piogge anche abbondanti e temporali, sulla costa soffierà Scirocco. Sabato saranno probabili ancora piogge e temporali.

### FENOLOGIA

Tutte le varietà hanno ultimato la fase della fioritura, ad eccezione del Cabernet Sauvignon che la sta comunque terminando. Le varietà più precoci hanno raggiunto lo stadio di grano di pepe.

### DIFESA

Peronospora – Domenica 31 maggio ha piovuto con intensità da 5 a 30 mm su tutto il territorio. Comunque la vegetazione era coperta dal precedente trattamento. Alla luce dell’elevata instabilità prevista nei prossimi giorni (soprattutto venerdì sabato e domenica), si consiglia di impiegare prodotti ad azione sistemica.

Oidio – Nell’ultima settimana non ci sono segnalazioni di focolai d’infezione, comunque le condizioni permangono favorevoli allo sviluppo del fungo.

Si consiglia perciò di intervenire entro giovedì 04 giugno con:

#### PERONOSPORA

benalaxil, benalaxil-M, bentiavalicarb, fluopicolide, iprovalicarb, metalaxil, metalaxil-M

#### OIDIO

bupirimate, IBS, metrafenone, proquinazid\*, quinoxifen, strobilurine.

**N.B.** Si raccomanda di rispettare le dosi ad ettolitro riportate in etichetta.

Si ricorda che devono passare almeno 2-3 ore dall’intervento senza pioggia per considerare efficace il trattamento.

In caso di grandinate intervenire entro 48 ore con rame o folpet\*

\*non ammesso nelle “Norme tecniche di produzione integrata”