

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 14 del 3 luglio 2009

INFORMAZIONI GENERALI

Il 20 febbraio 2009 il Comitato Produzione Integrata operante presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di conformità delle “Norme tecniche di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria delle colture e controllo delle infestanti” per l’anno 2009.

Il testo delle schede di coltura è consultabile sul sito dell’ERSA nella sezione “Avvertimenti e segnalazioni fitosanitarie” (<http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria>).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

Venerdì 3 luglio. Su pianura e costa avremo cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana maggiore variabilità con rovesci o temporali al pomeriggio, che successivamente interesseranno anche alcune zone della pianura e della fascia costiera.

Sabato 4 luglio. Su pianura e costa avremo cielo poco nuvoloso e caldo, sulla zona montana maggiore variabilità con rovesci o temporali al pomeriggio, che successivamente potrebbero interessare anche la pianura e la fascia costiera.

Domenica 5 luglio. Tendenza: Domenica avremo cielo da variabile a nuvoloso su tutta la regione con probabili rovesci e temporali sparsi.

FENOLOGIA

Tutte le varietà hanno superato la fase di chiusura grappolo; nelle varietà a grappolo compatto la maggior parte degli acini si toccano (BBCH 79).

DIFESA CRITTOGAME

Peronospora – Anche in questa settimana le condizioni di instabilità hanno creato i presupposti per lo sviluppo di infezioni peronosporiche. Pertanto permane la possibilità di attacchi. In relazione all’instabilità prevista per i prossimi giorni è necessario quindi garantire una buona protezione contro la malattia.

Oidio – Si ribadisce la persistenza di attacchi del fungo soprattutto su grappolo, segno che la pressione della malattia rimane elevata.

Si consiglia perciò di intervenire subito entro martedì 7 luglio con:

PERONOSPORA

Rame

OIDIO

zolfo bagnabile a dosi massime o zolfo in polvere nei vigneti in cui gli attacchi siano particolarmente consistenti

N.B. Si raccomanda di rispettare le dosi ad ettolitro riportate in etichetta.

Si ricorda che devono passare almeno 2-3 ore dall’intervento senza pioggia per considerare efficace il trattamento.

In caso di grandinate intervenire entro 48 ore con rame