

## AVVERTIMENTO VITICOLO n. 4 del 21 aprile 2010

### PREVISIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

**Mercoledì 21 aprile:** Su tutta la regione avremo al mattino bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio si avrà un aumento della nuvolosità sui monti e sulle zone orientali dove saranno probabili rovesci sparsi o qualche temporale, che tuttavia non saranno esclusi anche sulle altre zone. Sulla costa soffierà vento da sud-ovest a tratti moderato.

**Giovedì 22 aprile:** Su tutta la regione avremo cielo da variabile a localmente nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più probabili sui monti, ma possibili anche su pianura e costa dove soffierà Bora moderata.

**Venerdì 23 aprile, TENDENZA:** Su tutta la regione avremo cielo in genere variabile, localmente anche nuvoloso. Sui monti saranno probabili rovesci o temporali sparsi. Su pianura e costa sarà possibile qualche pioggia, in genere debole, ma anche qualche rovescio, specie verso sera.

### FENOLOGIA

Le varietà precoci presentano già le prime foglie aperte (BBCH 11-12), mentre quelle tardive sono ancora allo stadio da gemma d'inverno (BBCH 0) a gemma cotonosa (BBCH 5).



### SITUAZIONE FITOSANITARIA

#### Escoriosi

La generale assenza di precipitazioni dell'ultima settimana e le previsioni a breve termine, che non evidenziano piogge rilevanti, non determinano condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo. Non sono strettamente necessari interventi specifici ad eccezione dei vigneti in cui è stata riscontrata una notevole presenza di sintomi.

**N.B.** Su questo sito continueranno a cadenza settimanale informazioni sulla difesa del vigneto.

**N.B.** si raccomanda di rispettare scrupolosamente le dosi di etichetta.

**IMPORTANTE** registrare i trattamenti sul quaderno di campagna.

Le norme tecniche per la produzione integrata 2010 danno le seguenti limitazioni all'impiego di sostanze attive nei confronti dell'escoriosi.

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Escoriosi</b> ( <i>Phomopsis viticola</i> )	<p><b><u>Interventi agronomici</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante la potatura asportare le parti infette;</li> <li>• Negli impianti colpiti, non effettuare la trinciatura dei sarmenti o l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli</li> </ul> <p><b><u>Interventi chimici</u></b></p> <p>Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inizio del germogliamento;</li> <li>• dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.</li> </ul>	<p>Mancozeb (1)</p> <p>Metiram (1)</p> <p>(Piraclostrobin(2) + Metiram(1))</p> <p>(Zolfo + Rame)</p>	<p><b>La difesa va effettuata solo per le varietà sensibili</b></p> <p><b>(1) Non applicabili oltre l'allegagione</b></p> <p><b>(2) Indipendentemente dall'avversità Famoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin, Piraclostrobin e Trifloxystrobin non possono essere complessivamente</b></p>