

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 13 del 18 giugno 2009

BOTRITE

Le piogge verificatesi nei primi 20 giorni di maggio hanno favorito lo sviluppo della botrite e su parecchi vigneti si notava la presenza delle classiche macchie soprattutto su foglia. Il trattamento specifico contro questo fungo va fatto in **pre-chiusura grappolo** e soprattutto sulle varietà più sensibili ed a grappolo compatto. Quindi il viticoltore deve seguire lo stadio fenologico dei propri vigneti e intervenire quando si raggiunge la fase di **pre-chiusura grappolo**, indicativamente **dal 21 giugno in poi**.

Si ricorda che il trattamento va mirato unicamente nella **fascia dei grappoli** e non è quindi il caso di abbinarlo ai prodotti antiperonosporici ed antioidici.

È buona norma cercare di alternare i vari principi attivi nell'ambito della stessa stagione, di modo da non favorire l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

Principi attivi con specifica registrazione vite/botrite

Principi attivi	Famiglia chimica	Tempo di carenza	Note
<i>Bacillus subtilis</i>	agente biologico	3	agricoltura biologica
boscalid	anilidi	28	¹
cyprodinil + fludioxonil	fenilpirroli + anilopirimidine	21	²
fenhexamid	idrossianilidi	7	³
mepanipyrim	anilopirimidine	21	²
pyrimethanil	anilopirimidine	21	²

¹ prodotto impiegabile al massimo una volta all'anno indipendentemente dall'avversità

² prodotti impiegabili una volta all'anno in alternativa fra loro

³ prodotto impiegabile una sola volta all'anno