

AVVERTIMENTO VITICOLO n. 21 del 11 agosto 2010

PREVISIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)

Mercoledì 11 agosto: su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti bel tempo al mattino mentre dal pomeriggio saranno probabili maggiori annuvolamenti e sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale. Sulla costa soffierà la brezza.

Giovedì 12 agosto: sui monti avremo già dal mattino nuvolosità variabile; in giornata aumenterà la probabilità di rovesci o temporali, più diffusi in Carnia. Su pianura e costa al mattino avremo cielo in genere poco nuvoloso; in giornata si avrà un aumento della nuvolosità e dal pomeriggio-sera sarà possibile qualche rovescio o temporale. Sulla costa soffierà vento debole o moderato da sud.

Venerdì 13 agosto: Tendenza: venerdì avremo cielo in prevalenza nuvoloso con probabili temporali e piogge diffuse, da abbondanti a intense.

FENOLOGIA

Tutte le varietà hanno raggiunto la fase di invaiatura.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Crittogame

Con l'ultimo trattamento consigliato per il 9 agosto può considerarsi conclusa la campagna di difesa per le varietà bianche precoci (Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay). Per Tocai e Verduzzo, ecc., può essere opportuno ancora un trattamento, soprattutto se la nuova vegetazione presenta macchie di peronospora sporulata. Tale intervento va effettuato tenendo conto della probabile data di vendemmia per rispettare i tempi di carenza.

Le previsioni meteorologiche a lungo termine danno tempo perturbato per il fine settimana con un possibile miglioramento per l'inizio della settimana prossima.

Si consiglia, per le varietà a bacca rossa di ripristinare la copertura la prossima settimana **entro mercoledì 18 agosto** con i seguenti principi attivi:

Peronospora

Rame

Oidio

Zolfo bagnabile

N.B. In caso di grandinate intervenire entro 48 ore con prodotti a base di rame rispettando i tempi di carenza.

N.B. Su questo sito continueranno a cadenza settimanale informazioni sulla difesa del vigneto.

N.B. si raccomanda di rispettare scrupolosamente le dosi di etichetta.

IMPORTANTE registrare i trattamenti sul quaderno di campagna.

Disciplinare di Produzione Integrata del Friuli Venezia Giulia – Norme tecniche per la difesa della vite da vino – peronospora e oidio.

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Peronospora <i>(Plasmopara viticola)</i>	<p><u>Interventi chimici:</u></p> <p>Fino alla pre-fioritura Intervenire preventivamente sulla base della previsione delle piogge o prima dello scadere del periodo di incubazione.</p> <p>Dalla pre-fioritura alla allegagione Anche in assenza di macchie d'olio intervenire cautelativamente con cadenze in base alle caratteristiche dei prodotti utilizzati</p> <p>Successive fasi vegetative Le strategie di controllo sono in relazione alla comparsa o meno della malattia e all'andamento delle condizioni climatiche.</p>	Prodotti rameici Mancozeb (1) Metiram (1) Ditanon Fosetil Al Dimetomorf (2) Iprovalicarb (2) Mandipropamide (2) Cyazofamid (3) Famoxadone (4) Fenamidone (4) Pyraclostrobin (4) Cimoxanil (5) Zoxamide (6) Fluopicolide (7) <i>Fenilammidi:</i> (8) Benalaxil Benalaxil M Metalaxil Metalaxil-M	<p>(1) Vanno impiegati fino all'allegagione.</p> <p>(2) Al massimo 4 interventi all'anno in alternativa tra loro con CAA</p> <p>(3) Al massimo 3 interventi all'anno</p> <p>(4) Indipendentemente dall'avversità Famoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin, Piraclostrobin e Trifloxystrobin non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.</p> <p>(5) Al massimo 3 interventi all'anno</p> <p>(6) Al massimo 3 interventi all'anno</p> <p>(7) Al massimo 3 interventi all'anno</p> <p>(8) Al massimo 3 interventi all'anno con fenilammidi</p>
Oidio <i>(Uncinula necator - Oidium tuckeri)</i>	<p><u>Interventi chimici</u></p> <p>Zone ad alto rischio: Fino alla pre-fioritura Intervenire preventivamente con antioidici di copertura</p> <p>Dalla pre-fioritura all'invaiaatura Intervenire alternando prodotti sistemici e di copertura</p> <p>Zone a basso rischio: Intervenire cautelativamente nell'immediata pre-fioritura e proseguire gli interventi alternando prodotti sistemici e di copertura</p>	<i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo Azoxystrobin (1) Trifloxystrobin (1) (Pyraclostrobin + Metiram) (1)(9) Boscalid (2) IBE (3)*(vedi nota) Quinoxifen (4) Spiroxamina (5) Bupirimate (6) Meptildinocap (7) Metrafenone (8)	<p>(1) Indipendentemente dall'avversità Famoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin, Piraclostrobin e Trifloxystrobin non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.</p> <p>(2) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità</p> <p>(3) Al massimo 3 interventi con gli IBE</p> <p>(4) Al massimo 3 interventi all'anno</p> <p>(5) Al massimo 3 interventi all'anno</p> <p>(6) Al massimo 3 interventi all'anno</p> <p>(7) Al massimo 2 interventi all'anno</p> <p>(8) Al massimo 3 interventi all'anno</p> <p>(9) Non applicabile oltre l'allegagione</p>
<p>* IBE ammessi: Ciproconazolo (ammesse solo formulazioni non Xn), Fenbuconazolo, Miclobutanil , Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo, Triadimenol</p>			

Disciplinare di Produzione Integrata del Friuli Venezia Giulia – Norme tecniche per la difesa della vite da vino – Botrite e Black Rot.

<p>Muffa grigia (<i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>)</p>	<p><u>Interventi agronomici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Scelta di idonee forme di allevamento per i nuovi impianti preferire cvs con grappoli non serrati; equilibrate concimazioni e irrigazioni; carichi produttivi equilibrati; potatura verde e sistemazione dei tralci; efficace protezione dalle altre avversità. <p><u>Interventi chimici</u></p> <p>Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> pre-chiusura del grappolo; invasatura. 	<p>Mepanipirim (1) (3) Pyrimethanil (2) (3) (Cyprodinil + Fludioxonil)(3) Boscalid (4) Fenexamide</p>	<p>Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità.</p> <p>Un 3° intervento è ammesso negli impianti a tendone .</p> <p>(1) Al massimo 1 intervento all'anno (2) Al massimo 1 intervento all'anno (3) Tra Mepanipirim, Pyrimethanil e (Cyprodinil + Fludioxonil) al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità</p>
<p>Marciume nero (<i>Guignardia bidwellii</i>)</p>	<p><u>Interventi agronomici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> raccogliere e distruggere i grappoli infetti distruggere con il fuoco i residui di potatura <p><u>Interventi chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire solo nei vigneti a rischio 	<p>Mancozeb (1) Fenbuconazolo (2) Miclobutanil (2) Penconazolo (2) Tetraconazolo (2) Trifloxystrobin (3) (Pyraclostrobin + metiram) (1) (3)</p>	<p>(1) Non applicabili oltre l'allegagione</p> <p>(2) Indipendentemente dall'avversità, impiegabili al massimo 3 volte all'anno in alternativa tra loro e a Ciproconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo e Triadimenol (3) Indipendentemente dall'avversità Famoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.</p>
<p>* IBE ammessi: Ciproconazolo (ammesse solo formulazioni non Xn), Fenbuconazolo, Miclobutanil , Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo, Triadimenol</p>			