



AVVERTIMENTO VITICOLO N. 7 del 13/05/2013


ANDAMENTO METEOROLOGICO

La prima parte della settimana sarà caratterizzata da tempo soleggiato e temperature miti. Dalla giornata di giovedì 16 ci sarà un netto peggioramento con probabili abbondanti piogge che potrebbero durare fino al weekend.

Previsioni meteo settimanali

Martedì 14	Mercoledì 15	Giovedì 16	Venerdì 17	Sabato 18	Domenica 19	Lunedì 20

Nel grafico si riportano le zone più piovose degli ultimi 3 giorni



Fonte Arpa-Osmer; progetto Isloprada (www.isloprada.eu)

FENOLOGIA rilevata il 13/05/2013 nelle località indicate:

Le varietà sottoindicate sono tra BBCH 53 ossia infiorescenze chiaramente visibili e BBCH 57 infiorescenze pienamente sviluppate

DATA	VARIETA'	CASTIONS DI STRADA	CARLINO	CLAUJANO	CERVIGNANO	PALAZ.DELLO STELLA	LATISANA	PRECENICCO	RUDA	TERZO AQUILEIA	AQUILEIA
13/05	CHARDONNAY	55	55	55	55	55	55	/	55	55	55
13/05	PINOT GRIGIO	55	55	55	55	55	/	57	55	55	55
13/05	GLERA	/	/	57	55	57	57	57	/	/	57
13/05	MERLOT	/	/	55	55	/	/	55	55	53	55
13/05	REFOSCO	57	55	55	55	55	/	57	55	55	55

Scala BBCH

53	infiorescenza chiaramente visibile
55	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
57	infiorescenze pienamente sviluppate; fiori in fase di separazione



FOTO 1: BBCH 55 Pinot grigio 13 maggio



FOTO 2: BBCH 57 Glera 13 maggio

TRATTAMENTI DI DIFESA

Peronospora

Si segnalano le prime macchie di Peronospora sulla zona Doc Friuli Latisana e visto l'andamento climatico si consiglia di intervenire con prodotti a base di **Dimetomorf ** o Mandipropamide**** + **partner di copertura (Metiram o Propineb o preferibilmente Dithianon data la sua minor dilavabilità)** entro la giornata di

Mercoledì 15 maggio

Ricordiamo che questi prodotti ad azione endoterapica per espletare la loro massima funzionalità, devono essere eseguiti su vegetazione asciutta e non deve essere seguita da precipitazioni dilavanti per almeno 2-3 ore.

**** Nel disciplinare di produzione integrata sono previsti al massimo 4 interventi all'anno in alternativa tra di loro**

Nei vigneti biologici contro peronospora utilizzare i classici prodotti a base di rame (ossicloruro, idrossido, solfato) ad intervalli non superiori ai 7 giorni, e rientrando con gli stessi appena possibile dopo eventuali piogge dilavanti.

Oidio

In chiave antioidica utilizzare prodotti a base di **IBE*** (*Ciproconazolo, Difenconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo, Triadimenol*) o **Meptildinocap****.

* Nel disciplinare di produzione integrata al massimo 3 interventi all'anno con gli IBE, **INDIPENDENTEMENTE** dall'avversità. Non ammesse formulazioni XN

** Nel disciplinare di produzione integrata al massimo 2 interventi all'anno

Nei vigneti biologici la lotta all'oidio può essere condotta con prodotti a base di zolfo bagnabile (2-3 Kg/ettaro).

CONCIMAZIONE FOGLIARE

Si consiglia di utilizzare prodotti fogliari a base di microelementi abbinati a **Fosfiti di Potassio** per migliorare la risposta della pianta alle carenze fisiologiche. Su varietà sensibili, quali ad esempio Glera e Cabernet Franc, alle carenze di Boro è consigliato un apporto di questo microelemento da effettuarsi nelle ore serali e da solo intervenendo prima della fioritura.

TIGNOLA E TIGNOLETTA

Si segnala che le catture di tignola e tignoletta stanno diminuendo e che il volo della prima generazione sta terminando.

ALTRE AVVERSITA'

Si segnalano le prime macchie di botrite su foglia nelle varietà Merlot e Glera.

Su Traminer, Glera e Pinot grigio si riscontrano lievi attacchi di escoriosi.

Su varietà sensibili come Pinot grigio e Chardonnay si notano carenze nutrizionali e clorosi.

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010
Dott. Gabriele Marchi..... Cell. 339-4180516

I dati e le informazioni contenute nel presente avvertimento sono riservate e di proprietà dei Consorzi di Tutela Doc Friuli Aquileia, Doc Friuli Annia e Doc Friuli Latisana.