

SERVIZIO DI LOTTA GUIDATA E INTEGRATA IN VITICOLTURA AVVERTIMENTO N° 14 del 24/07/2013

Dati piovosità (mm pioggia)

n.d.: dato non disponibile

Località	17/07	18/07	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	24/07
Dolegna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Lonzano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Pradis Cormons	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Capriva	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Lucinico	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
Oslavia	0.0	0.0	0.2	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0
Gradisca Is.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Aurisina(TS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
Sgonico(TS)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0

PREVISIONI DEL TEMPO: l'anticiclone africano nei prossimi giorni si impadronirà del Mediterraneo favorendo anche sulla regione sia un progressivo afflusso di masse d'aria molto calde, che l'accumulo di umidità nei bassi strati dell'atmosfera. Su pianura e costa avremo cielo in prevalenza sereno ma con possibile foschia. Venti a regime di brezza e caldo afoso. (Fonte Osmer: www.meteo.fvg.it)

FASE FENOLOGICA: tutte le varietà presentano grappoli con acini che stanno raggiungendo le loro massime dimensioni; inizio invaiatura (BBCH 80) su qualche vigneto di pinot grigio posizionato in zone più esposte e storicamente precoci.

CURE ALLA VEGETAZIONE: attenzione nelle operazioni di sfogliatura sulla fascia dei grappoli, in quanto sbalzi termici e giornate limpide e soleggiate, potrebbero provocare scottature (ustioni) ai grappoli esposti.

PERONOSPORA

Situazione: si rilevano alcune macchie su giovani femminelle talvolta sporulanti (fresche), si raccomanda di controllare bene i vigneti.

Consigli: è opportuno rinnovare la protezione della vegetazione intervenendo entro

venerdì 26 luglio utilizzando prodotti ad azione di contatto a base di **Rame (Idrossidi, Ossicloruri e Poltiglia bordolese)** alle dosi massime di etichetta.

Con le alte temperature sono da preferire gli Ossicloruri perché meno aggressivi sulla vegetazione.

Coloro che nel precedente trattamento avessero utilizzato la **Cyazofamide**, possono considerare di allungare l'intervallo intervenendo a circa una decina di giorni dall'ultimo impiego.

OIDIO

Situazione: si segnalano diffusi focolai del fungo; si raccomanda un attento controllo della vegetazione per rilevare i sintomi.

Consigli: nelle situazioni non critiche abbinare all'antiperonosporico lo **zolfo bagnabile micronizzato** alle dosi massime di etichetta consigliate per il periodo. **In presenza di focolai del fungo contattare il tecnico.**

BOTRITE

Situazione: non si segnala al momento la presenza del fungo all'interno dei grappoli.

Consigli: sui vitigni a grappolo compatto in cui dovessero riscontrarsi i sintomi, si renderà necessario intervenire in fase di invaiatura o a 28-21 giorni dalla vendemmia con antibiotritici specifici. Le sostanze attive saranno indicate nei prossimi avvertimenti.

TIGNOLE

Situazione: prosegue il monitoraggio del volo della 2^a generazione di tali insetti.

Consigli: la strategia di lotta già proposta ha previsto l'utilizzo dell'insetticida **Clorpirifos (etile- metile)** efficace contro le cicaline, compreso lo *Scaphoideus titanus* vettore di Flavescenza dorata (FD) e le tignole.

CICALINA VERDE

Situazione: si riscontra la presenza di cicalina verde (*Empoasca vitis*) che punge i tessuti fogliari e provoca il disseccamento dei bordi.

Consigli: valutare la presenza e la quantità di tale insetto. In caso di forti sintomi contattare il tecnico.

INFORMAZIONI UTILI

Le sostanze attive e le limitazioni d'uso indicate nel presente avvertimento rispettano quanto previsto dalle prescrizioni riportate nelle **NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA EMANATE DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA** (delibera n. 981 approvata dalla Giunta Regionale il 7 giugno 2013).

Per chi segue il disciplinare regionale di difesa integrata, si ricorda che i ditiocarbammati (mancozeb e metiram), non sono impiegabili oltre l'allegazione.