



AVVERTIMENTO VITICOLO N.02 del 20/03/2014

FENOLOGIA

Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici in questi ultimi giorni, la fenologia al momento presenta un netto anticipo rispetto alla scorsa stagione, ad esempio nella varietà Glera il BBCH al 19/03 risulta mediamente tra il 09 (il germoglio si espande ma è ancora chiuso) e il 10 (il germoglio si apre) con alcune punte a 11 (una foglia è separata dal germoglio). La fenologia media delle altre varietà precoci oscilla tra i valori medi di BBCH 07-09 mentre per quelle più tardive tra 05-06.



BBCH 09-10 varietà Glera 19/03



Gemma bifida e punta con BBCH 11 19/03

DISERBO

Per chi non avesse effettuato il diserbo primaverile del sottofilare può essere fatto attraverso diverse strategie che prevedono, in presenza di infestanti, l'utilizzo di prodotti ad azione fogliare quali:

✓ **Glifosate (30,4% s.a.):** *indipendentemente dall'utilizzo il quantitativo massimo annuo ammesso è di 9 L/Ha*

Oppure nel caso di infestanti quali graminacee e dicotiledoni ai primi stadi di sviluppo prodotti ad azione residuale e anti-germinello:

- ✓ **Oxifluorfen (22,9% s.a.)** : da utilizzare a dosi ridotte (0,3 L - 0,5 L per intervento) in miscela con altri prodotti sistemici. Dose anno massima ammessa 1 L/Ha.
- ✓ **Flazasulfuron (25% s.a.)**: da utilizzarsi in miscela con il glifosate, nel periodo di fine inverno – inizio primavera ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. Dose anno massima 0,07 Kg/Ha
- ✓ **Pyraflufen-ethyl (2,5% s.a.)**: impiegabile alla dose di 0,8 l/ha per trattamento con un limite massimo di 1,6 l/ha all'anno.
- ✓ **Carfentrazone etile (6,45% s.a.)**: utilizzabile anche per il controllo dei polloni. Indipendentemente dall'utilizzo il quantitativo massimo annuo ammesso è di 1 L/Ha
- ✓ **Ciclossidim (10,9% s.a.) - Isoxaben (45,5% s.a.) - Pendimetalin (38,72% s.a.)**: solo nei primi 2 anni di allevamento e localizzati sulla fila con una dose massima di 2 l/ha.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Disciplinare di Produzione Integrata delle colture 2013 - 2014 "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti"

COCCINIGLIE

Negli ultimi anni un problema sempre maggiore è rappresentato dagli attacchi di cocciniglie (Planococcus ficus e Pulvinarie), un esempio nella foto qui sotto:



Planococcus ficus su tronco di vite 19/03

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010
Dott. Gabriele Marchi..... Cell. 339-4180516

I dati e le informazioni contenute nel presente avvertimento sono riservate e di proprietà dei Consorzi di Tutela Doc Friuli Aquileia, Doc Friuli Annia e Doc Friuli Latisana; il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con ERSA e finanziata dalla legge regionale 5 del 2006 SISSAR lettera C2.