



AVVERTIMENTO VITICOLO n° 11 del 17 MAGGIO 2011

ANDAMENTO CLIMATICO

Per tutta la settimana è previsto cielo in prevalenza sereno. Nelle zone alpine ancora qualche annuvolamento. Temperature massime in aumento. Venti: moderati di foehn nelle vallate alpine, deboli altrove.

Cervignano (maggio)

GIORNO	PRECIPIT. TOTALE [mm]	TEMP. MINIMA [°C]	TEMP. MEDIA [°C]	TEMP. MASSIME [°C]	UMIDITÀ MEDIA [%]
9	0	9,5	17,6	24,9	38
10	0	8,3	18,9	27,8	48
11	0	9,8	19,5	27,7	53
12	0	11,6	20,6	27,5	52
13	0	13,2	21,4	30,1	56
14	0	12,4	20,4	26,5	59
15	43,1	9,7	12,9	19	86

Palazzolo dello stella (maggio)

GIORNO	PRECIPIT. TOTALE [mm]	TEMP. MINIMA [°C]	TEMP. MEDIA [°C]	TEMP. MASSIME [°C]	UMIDITÀ MEDIA [%]
9	0	9	17,3	23,9	40
10	0	8,9	19,3	27,8	48
11	0	11,1	20,4	29,1	59
12	1,3	12,8	21	28,1	58
13	0	14,3	21,7	29,5	60
14	0,5	13,5	20,8	26,3	64
15	27	10,6	13,5	19,5	83

Talmassons (maggio)

GIORNO	PRECIPIT.TOTALE [mm]	TEMP. MINIMA [°C]	TEMP.MEDIA [°C]	TEMP.MASSIME [°C]	UMIDITÀ MEDIA [%]
9	0	8	16,9	24,3	48
10	0	9,6	19,1	27,2	51
11	0	10,7	19,7	27,8	61
12	0,1	12,7	20,5	27,6	59
13	0	13,7	21,8	29,8	58
14	0,4	13,6	20,2	26,5	68
15	49,3	10,1	13	18,8	90

FENOLOGIA DELLA VITE

Nelle varietà precoci, nelle zone dei vari consorzi di monitoraggio si sta iniziando a notare i primi cappucci fiorali staccati (*foto 1;2*). Questa è una fase molto delicata perché dal suo andamento dipende la quantità di fiori che allegano e in definitiva il peso dei grappoli. Per questo motivo la vite in questa fase non deve essere “disturbata” con **prodotti quali insetticidi** (vietati anche dalla legge) per i danni che possono arrecare agli insetti impollinatori, **e tutti i concimi fogliari** per l’azione fitotossica che possono avere sui fiori. (**il secondo trattamento, consigliato con il boro nelle varietà quali Verduzzo friulano, il Prosecco e il Cabernet franc deve essere eseguito in questa settimana in quanto non si nota l’inizio di questa fase**).



Foto 1: Chardonnay (BBCH 61)
del 14/05/2011



Foto 2: Pinot grigio (BBCH 60) si nota un cappuccio
cappuccio fiorale staccato (14/05/2011)

FENOLOGIA DELLA VITE

VARIETA'	DOC AQUILEIA (BBCH)	DOC ANNIA (BBCH)
CHARDONNAY e/o PINOT BIANCO	60 (61)	60 (61)
PINOT GRIGIO	60	60
REFOSCO P.R.	57	57
CABERNET	57	57
MERLOT	57	57
PROSECCO	60	57
SAUVIGNON	57	57
FRIULANO	57	57

BBCH 57: infiorescenza pienamente sviluppate; fiori in fase di separazione

BBCH 60: prime caliptré distaccate dal ricettacolo

BBCH 61 : inizio della fioritura: 10% di caliptré cadute

PERONOSPORA

Sulla base dello sviluppo fenologico della vite e dell'andamento climatico della settimana scorsa si consiglia di intervenire **entro MERCOLEDI' 18 MAGGIO** con prodotti a base di **(Dimetomorf o Iprovalicarb o Mandipropamide) + partner di copertura (mancozeb o metiram)**.

VITICOLTURA BIOLOGICA: Contro questa ampelopatia si consiglia di utilizzare i classici prodotti a base di rame (ossicloruro, idrossido, solfato) ad intervalli non superiori

ai 7 giorni, e rientrando con gli stessi appena possibile dopo eventuali piogge dilavanti.

OIDIO

In chiave antioidica utilizzare prodotti a base di **IBE** (*Ciproconazolo (ammesse solo formulazioni non Xn) fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, propiconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo, Triadimenol*) o **Metrafenone o Spiroxamina o Meptildinocap (impiegabile al massimo 2 volte all'anno)**.

VITICOLTURA BIOLOGICA: La lotta all'oidio può essere condotta con prodotti a base di

zolfo bagnabile (3-4 Kg/ettaro) o in polvere (20-25 Kg/ettaro).

Si ricorda che il trattamento con questi prodotti ad azione endoterapica, per espletare la loro massima funzionalità, deve essere eseguito su vegetazione asciutta e non deve essere seguito da precipitazioni dilavanti per almeno 2-3 ore. Inoltre il loro utilizzo, tranne il meptildinocap (massimo 2 volte all'anno), in base alla famiglia chimica di appartenenza, non deve superare i 3 trattamenti/anno;

CONCIMAZIONE FOGLIARE con boro

Nelle varietà quali **Verduzzo friulano, il Prosecco e il Cabernet franc** è consigliabile il secondo trattamento a base di boro. I trattamenti vanno fatti da soli, possibilmente nelle ore serali della giornata.

OPERAZIONI COLTURALI

Si consiglia di ultimare in questa settimana le operazioni di spollonatura (eliminazione dei germogli presenti lungo il fusto) e di scacchiatura (eliminazione dei germogli doppi o deboli o in eccesso lungo il capo a frutto).

Le sostanze attive indicate nel presente avvertimento rispettano quanto previsto dalle prescrizioni riportate nelle Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti del "Disciplinare Produzione Integrata FVG - Anno 2011" emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia TEL/FAX 0431/34010
Tecnico di servizio..... Cell. 339-4180516

Il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con **ERSA** e finanziato dalla legge regionale 5 del 2006 SISSAR lettera C2.