



AVVERTIMENTO VITICOLO n° 3 del 23 MARZO 2011

ANDAMENTO CLIMATICO

Previsto cielo sereno con temperature medie comprese tra i 12 e 17 °C fino a venerdì 25 marzo.

Sabato probabili nubi sparse interesseranno il comprensorio Ania ed Aquileia, con probabili piogge previste nella giornata di domenica 27 marzo.

Sezione Consorzio Tutela vini Doc Friuli Aquileia.

DATA	CAPANNINA	PIOGGIA (mm)	TEMP. MEDIA (°C)
17 marzo 2011	FOSSALON	8,7	11,61
	PALMANOVA	24,7	11,00
	CERVIGNANO	14,9	11,46
18 marzo 2011	FOSSALON	0,4	12,06
	PALMANOVA	0,6	12,18
	CERVIGNANO	0,4	11,92
19 marzo 2011	FOSSALON	0,3	11,55
	PALMANOVA	0,0	10,92
	CERVIGNANO	0,1	11,06
20 marzo 2011	FOSSALON	0,0	10,72
	PALMANOVA	0,0	9,64
	CERVIGNANO	0,0	9,59

Sezione Consorzio Tutela vini Doc Friuli Annia.

DATA	CAPANNINA	PIOGGIA (mm)	TEMPERATURA MEDIA (°C)
17 marzo 2011	TALMASSONS	17,9	11,41
	TORVISCOSA	28,4	10,92
	CASTIONS di S.	27,4	11,41
18 marzo 2011	TALMASSONS	0,0	11,87
	TORVISCOSA	1,0	12,12
	CASTIONS di S.	0,6	11,87
19 marzo 2011	TALMASSONS	0,0	10,86
	TORVISCOSA	0,2	11,13
	CASTIONS di S.	0,2	10,86
20 marzo 2011	TALMASSONS	0,0	9,58
	TORVISCOSA	0,0	10,48
	CASTIONS di S.	0,0	9,58

FENOLOGIA DELLA VITE

Verso la fine della scorsa settimana è iniziata la fase del pianto (vedi foto), che indica l'inizio del periodo di accrescimento vegetativo della pianta; solitamente si manifesta una decina di giorni prima del germogliamento ed è la naturale conseguenza dell'aumento del ritmo di assorbimento da parte dell'apparato radicale.

Nei primi giorni di questa settimana, nei vigneti dei comprensori Doc Friuli AQUILEIA e Doc Friuli ANNIA, nelle varietà quali : Chardonnay, Pinot bianco e Prosecco, Refosco p.r, ecc. presentavano ancora la maggior parte delle gemme nello stadio fenologico di gemma d'inverno (fase A; Baggiolini – BBCH 0)



Foto 1: fase del pianto in varietà Chardonnay (22 marzo)



Foto 2: fase del pianto in varietà Pinot grigio (22 marzo)

DISERBO

(Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Disciplina di Produzione Integrata delle colture 2010 – 2011 "Norme tecniche per il controllo delle infestanti")

Il diserbo primaverile del sottofilare si realizza attraverso diverse strategie che prevedono, in presenza di infestanti, l'utilizzo di prodotti ad azione fogliare come:

- **Glifosate** (sistemico)

Indipendentemente dall'utilizzo il quantitativo massimo annuo ammesso è di 7,5 L/Ha

Oppure nel caso di terreni privi di infestanti prodotti ad azione residuale e antigerminello quali:

- **Oxifluorfen** (22,9 %S.a.) (graminacee e dicotiledoni)

Da utilizzare a dosi ridotte (L 0,3--0,45 per intervento) in miscela con altri prodotti sistemici.

Dose anno massimo ammessa 1 L/Ha

- **Flazasulfuron** (25 % S.a.) (graminacee e dicotiledoni)

Da utilizzarsi in miscela con il glifosate, nel periodo di fine inverno – inizio primavera ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi.

Dose anno ammessa 0,07 Kg/Ha

- **Carfentrazone etile** (6,45 % S.a.) (graminacee e dicotiledoni)

Utilizzabile anche per il controllo dei polloni. Indipendentemente dall'utilizzo il quantitativo massimo annuo ammesso è di 1 L/Ha

- **Ciclossidim** (10,9 % S.a.), **Isoxaben** (45,5 % S.a), **Pendimetalin** (38,72 %S.a)
(graminacee e dicotiledoni)

Utilizzabile solo nei primi 2 anni di allevamento e localizzati sulle fila.

Indipendentemente dall'utilizzo il quantitativo massimo annuo ammesso è di 2 L/Ha.

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010
Tecnico di servizio.....cell. 339/4180516

Il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con ERSR e finanziato dalla legge regionale 5 del 2006 SISSAR lettera C2.