



## AVVERTIMENTO VITICOLO n° 8 del 27 APRILE 2011

### ANDAMENTO CLIMATICO

Nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile è previsto tempo instabile con deboli rovesci o piogge.

Tale instabilità si protrarrà tutta la settimana con intermittenza di schiarite a piogge deboli.

Sezione Consorzio Tutela vini Doc Friuli Aquileia.

DATA	CAPANNINA	PIOGGIA (mm)	TEMP. MEDIA (°C)
22 aprile 2011	FOSSALON	0,0	14,22
	PALMANOVA	0,0	14,63
	CERVIGNANO	0,0	14,27
23 aprile 2011	FOSSALON	0,0	15,34
	PALMANOVA	0,0	15,01
	CERVIGNANO	0,0	14,71
24 aprile 2011	FOSSALON	0,0	15,64
	PALMANOVA	0,0	15,16
	CERVIGNANO	0,0	15,26
25 aprile 2011	FOSSALON	0,0	17,97
	PALMANOVA	0,8	16,57
	CERVIGNANO	0,1	16,34

Sezione Consorzio Tutela vini Doc Friuli Annia.

<b>DATA</b>	<b>CAPANNINA</b>	<b>PIOGGIA (mm)</b>	<b>TEMPERATURA MEDIA (°C)</b>
<b>22 aprile 2011</b>	TALMASSONS	0,0	14,37
	TORVISCOSA	0,0	14,67
	CASTIONS di S.	0,0	14,37
<b>23 aprile 2011</b>	TALMASSONS	0,0	15,06
	TORVISCOSA	0,0	15,31
	CASTIONS di S.	0,0	15,06
<b>24 aprile 2011</b>	TALMASSONS	0,0	15,52
	TORVISCOSA	0,0	15,26
	CASTIONS di S.	0,0	15,52
<b>25 aprile 2011</b>	TALMASSONS	0,0	16,65
	TORVISCOSA	0,0	16,82
	CASTIONS di S.	0,0	16,54

## FENOLOGIA DELLA VITE

Il clima particolarmente caldo di questi giorni ha sicuramente favorito lo sviluppo vegetativo della vite, anche se si può osservare una differenza significativa soprattutto tra le varietà precoci e quelle tardive. Infatti, mentre lo Chardonnay e i prosciocchi presentano mediamente i germogli nello stadio di foglie distese (fase E; Baggiolini)-grappolini visibili (fase F; Baggiolini) con lunghezza anche superiore ai 15 cm. e 4-5 foglie spiegate, i Cabernet si trovano mediamente nella fase di comparsa della prima e seconda foglia. I Pinot sono generalmente più indietro sia rispetto allo Chardonnay sia al Refosco, che soprattutto nella bassa Aquileia e Annia presenta i germogli prevalentemente nella fase di foglie distese con i grappolini visibili (lunghezza dei germogli intorno ai 13-14 cm. e 3-4 foglie spiegate. Si nota una disomogeneità di germogliamento sia nei cabernet che nei merlot.

(dati medi rilevati dal monitoraggio)

<b>VARIETA'</b>	<b>DOC AQUILEIA (BBCH)</b>	<b>DOC ANNIA (BBCH)</b>
<b>CHARDONNAY e/o PINOT BIANCO</b>	<b>14 / 53</b>	<b>14 / 53</b>
<b>PINOT GRIGIO</b>	<b>13 / 53</b>	<b>13 / 53</b>
<b>REFOSCO P.R.</b>	<b>14 / 53</b>	<b>14 – 15 / 53</b>
<b>CABERNET</b>	<b>11 / 53</b>	<b>11 / 53</b>
<b>MERLOT</b>	<b>12 / 53</b>	<b>12 / 53</b>
<b>PROSECCO</b>	<b>15 / 53</b>	
<b>SAUVIGNON</b>	<b>12 / 53</b>	<b>12 / 53</b>
<b>FRIULANO</b>	<b>12 / 53</b>	<b>13 / 53</b>

BBCH 10:	il germoglio si apre
BBCH 11:	una foglia è spiegata e separata dal germoglio
BBCH 12:	due foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 13:	tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 14:	quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 15:	cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 51:	grappoli appena visibili
BBCH 53:	grappoli infiorescenza chiaramente visibile

### **ESCORIOSI / PERONOSPORA**

Considerando la fase fenologica della maggior parte delle varietà è consigliato un trattamento con prodotti a base di ditiocarbammati (**Mancozeb o Metiram o Rame**) alla dose consigliata di etichetta facendo riferimento alla vegetazione presente.

### **OIDIO**

E' consigliabile l'utilizzo di **zolfo bagnabile micronizzato**, nei vigneti dove l'anno scorso si erano riscontrati focolai di oidio si consiglia l'utilizzo di **Meptildinocap**.

### **ERINOSI**

Si registrano sporadici attacchi di erinosi per cui in caso di presenza si consiglia di chiamare i tecnici per un sopralluogo.

<b>Recapiti telefonici :</b>
<b>Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia ..... tel. 0431/34010</b>
<b>Tecnico di servizio.....cell. 339/4180516</b>