



AVVERTIMENTO VITICOLO n° 9 del 3 MAGGIO 2011

ANDAMENTO CLIMATICO

Nelle giornate di domani martedì 3 maggio e mercoledì 4 maggio probabili piovvaschi alternati a schiarite.

Da giovedì cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Sezione Consorzio Tutela vini Doc Friuli Aquileia.

DATA	CAPANNINA	PIOGGIA (mm)	TEMP. MEDIA (°C)
28 aprile 2011	FOSSALON	0,1	16,6
	PALMANOVA	0,8	16,0
	CERVIGNANO	0,2	16,1
29 aprile 2011	FOSSALON	4,2	16,1
	PALMANOVA	0,0	15,7
	CERVIGNANO	8,1	15,4
30 aprile 2011	FOSSALON	0,0	16,5
	PALMANOVA	0,0	16,3
	CERVIGNANO	0,0	15,7
01 maggio 2011	FOSSALON	0,0	17,3
	PALMANOVA	0,2	16,0
	CERVIGNANO	0,0	16,6

Sezione Consorzio Tutela vini Doc Friuli Annia.

DATA	CAPANNINA	PIOGGIA (mm)	TEMPERATURA MEDIA (°C)
28 aprile 2011	TALMASSONS	0,2	16,8
	TORVISCOSA	0,4	16,4
	CASTIONS di S.	0,4	16,8
29 aprile 2011	TALMASSONS	2,0	15,6
	TORVISCOSA	0,8	16,0
	CASTIONS di S.	0,6	15,6
30 aprile 2011	TALMASSONS	0,0	15,8
	TORVISCOSA	0,0	16,7
	CASTIONS di S.	0,0	15,8
01 maggio 2011	TALMASSONS	0,4	16,9
	TORVISCOSA	0,2	16,9
	CASTIONS di S.	0,0	16,9

FENOLOGIA DELLA VITE

(dati medi rilevati dal monitoraggio)

VARIETA'	DOC AQUILEIA (BBCH)	DOC ANNIA (BBCH)
CHARDONNAY e/o PINOT BIANCO	16-53	16-53
PINOT GRIGIO	15-53	
REFOSCO P.R.	16-53	17-53
CABERNET	14-53	14-53
MERLOT	15-53	15-53
PROSECCO	17-53	
SAUVIGNON	14-53	14-53
FRIULANO	15-53	16-53

BBCH 14:	quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 15:	cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 16:	sei foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 17:	sette foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 18:	otto foglie sono spiegate e separate dal germoglio
BBCH 51:	grappoli appena visibili
BBCH 53:	grappoli infiorescenza chiaramente visibile

PERONOSPORA

In alcuni vigneti, soprattutto nella varietà di Tocai Friulano sono state segnalate in forma ridotta e non sporificate le prime macchie di peronospora.

Questo sta' a significare che la presenza della crittogama legato allo stadio fenologico della pianta particolarmente sensibile risulta essere già attiva.

Considerando la fase fenologica della maggior parte delle varietà è consigliato un trattamento con prodotti a base di ditiocarbammati (**Mancozeb o Metiram**) o **Rame** alla dose consigliata di etichetta facendo riferimento alla vegetazione presente.

OIDIO

E' consigliabile l'utilizzo di **zolfo bagnabile micronizzato**, nei vigneti dove l'anno scorso si erano riscontrati focolai di oidio si consiglia l'utilizzo di **Meptildinocap** .

ERINOSI e CECIDOMIA

In molti vigneti sono riscontrabili le caratteristiche bollosità procurate dagli agenti patogeni *Colomerus Vitis* e *Dichelomyia Oenophila* che si caratterizzano per Erinosi e Cecidomia.

Occorre porre attenzione a non confondere tale sintomo con le macchie causate da altri agenti patogeni.

Per chi abbia riscontrato tali sintomi è preferibile chiamare i tecnici prima di intervenire.

SPOLLONATURE

In questo momento si nota un'abbondante sviluppo dei polloni alla base del tronco, quindi si consiglia di effettuare la spollonatura attraverso azione meccanica o di tipo chimica mediante l'utilizzo di prodotti a base di **Carfentrazone-etile**, molecola appartenete alla famiglia degli **Aril – triazolinoni**.

PROBLEMI DI GERMOGLIAMENTO

In generale i germogliamenti soddisfacenti. Solo in alcuni casi si notano delle anomalie che possono essere causate da diversi fattori:

- **acariosi e tripidi** pericolosi solo nei giovani impianti (1-2 anni),
- **ragno rosso** presente sporadicamente specie nei vigneti in produzione,
- **squilibri fisiologici** più frequenti nel pinot grigio e cabernet sauvignon,
- **caratteristiche varietali** (es. merlot).

Qualora si notino germogliamenti stentati o arresti di vegetazione, vista la molteplicità delle cause si consiglia di interpellare i tecnici prima di intervenire.

CONCIMAZIONE FOGLIARE

Si consiglia di utilizzare prodotti fogliari a base di microelementi abbinati a **Fosfiti di Potassio** per migliorare la risposta della pianta a carenze fisiologiche.

VITICOLTURA BIOLOGICA

Contro peronospora utilizzare i classici prodotti a base di rame (ossicloruro, idrossido, solfato) ad intervalli non superiori ai 7 giorni, e rientrando con gli stessi appena possibile dopo eventuali

piogge dilavanti. La lotta all'oidio può essere condotta con prodotti a base di zolfo bagnabile (2-3 Kg/ettaro) o in polvere (20-25 Kg/ettaro).

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010
Tecnico di servizio.....cell. 339/4180516

Il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con ERSA e finanziato dalla legge regionale 5 del 2006 SISSAR lettera C2.