

CONSORZIO TUTELA VINI COLLIO e CARSO



Via A. Gramsci, 2-4
34071 CORMONS (GO)
Tel. 0481 630303
Fax 0481 630660

Servizio tecnico viticolo 0481 630303
Totis Fabrizio 335 8184095
serviziovitico@collio.it
difesaintegrata@collio.it
www.collio.it



SERVIZIO DI DIFESA INTEGRATA IN VITICOLTURA AVVERTIMENTO N°7 del 30/05/2011

Dati piovosità (mm pioggia)

n.p.: dato non pervenuto

Località	24/05/2011	25/05/2011	26/05/2011	27/05/2011	28/05/2011	29/05/2011	30/05/2011
Dolegna	1.6	0.2	0.0	0.6	40,0	0.0	0.0
Lonzano	3.4	0.2	0.6	0.4	39,4	0.0	0.0
Cormons	0.6	0.0	0.0	0.0	62,8	0.0	0.0
Capriva	1.4	0.0	0.0	5.2	55,0	0.0	0.0
Lucinico	3.0	1.8	0.0	0.5	32,3	0.0	0.0
Oslavia	0.8	0.8	0.0	0.2	12,8	4.2	0.0
Gradisca	0.0	0.0	0.0	4.0	42,2	0.0	0.0
Aurisina(TS)	0.2	1.0	0.2	0.2	9.8	0.0	0.0
Sgonico(TS)	3.2	0.0	0.0	12.7	4,6	0.0	0.0

PREVISIONI DEL TEMPO: da martedì sera sono previsti rovesci sparsi e forse qualche temporale; nel corso della giornata di mercoledì la probabilità di pioggia diminuirà ma avremo comunque nuvolosità variabile con la possibilità di qualche ulteriore rovescio.

FASE FENOLOGICA: tutte le varietà sono in piena fioritura; i vitigni precoci sono già allegati e hanno acini che possono raggiungere le dimensioni del grano di pepe (J).

CURE ALLA VEGETAZIONE: nei vitigni già ben allegati (ingrossamento dell'ovario) procedere con le cimature per la corretta gestione della chioma e migliorare la penetrazione degli antiparassitari (lotta alla botrite mirata al grappolo).

PERONOSPORA

Situazione: Si raccomanda di proseguire con il controllo della vegetazione per verificare presenza e entità delle infezioni.

Consigli: è opportuno rinnovare la protezione della vegetazione intervenendo entro **sabato 04 giugno** con endoterapici in miscela con prodotti di contatto: **Dimethomorph + Mancozeb, Iprovalicarb + Mancozeb, Mandipropamid +**

Mancozeb, Metalaxyl + Mancozeb, Benalaxyl + Mancozeb. Qualora si volesse evitare l'uso di Ditiocarbammati si può intervenire con **Fluopicolide + Fosetil di Alluminio** oppure **Mandipropamid + Fosetil Alluminio** ad una dose media a ettolitro.

Utilizzare 3-4 hl di acqua per ettaro. In caso di irrorazioni con volumi inferiori si raccomanda di mantenere costante la dose di sostanza attiva/ettaro, come prima indicato, bagnando bene tutta la vegetazione.

OIDIO

Situazione: le condizioni climatiche sono ora favorevoli al patogeno e si segnalano alcuni piccoli focolai del fungo; per tale motivo si raccomanda un attento controllo della vegetazione per rilevare i primi sintomi.

Consigli: abbinare alla difesa antiperonosporica una delle seguenti sostanze attive: **Spiroxamina, Metrafenone, Meptyl-dinocap, IBE (Fenbuconazole, Myclobutanil, Penconazole, Propiconazole, Tebuconazole, Tetraconazole)** alle dosi indicate in etichetta.

In alternativa è possibile utilizzare dello **zolfo in polvere 20 - 25 kg/ha.**

TIGNOLE

Situazione: prosegue il monitoraggio dei voli di tignola e tignoletta che si considera concluso. Dai rilievi dei nidi della prima generazione risulta una diffusione del parassita piuttosto contenuta e al di sotto delle soglie di intervento.

Consigli: le larve di 1^a generazione **raramente sono dannose** alle infiorescenze.

SCAFOIDEO

Situazione: sono iniziati i monitoraggi sulla fenologia di *Scaphoideus titanus* in collaborazione con i tecnici dell'ERSA. Attualmente in Collio si registra una presenza di scafoideo al primo stadio giovanile mentre in Carso si è rilevata anche la presenza di individui di seconda età.

Seguirà uno specifico avvertimento per la contemporanea lotta insetticida a tignole e cicaline (compreso *Scaphoideus titanus*, oggetto di lotta obbligatoria, che ha

raggiunto il 2° stadio di sviluppo (neanide) al momento non in grado di essere infettivo).

INFORMAZIONI UTILI

Per chi segue il disciplinare regionale di difesa integrata, si ricorda che i ditiocarbammati (mancozeb e metiram), non sono impiegabili oltre l'allegazione.

I prodotti commerciali aventi come sostanza attiva il **Mancozeb** puro o in miscela hanno acquisito la classe tossicologica Xn (nocivo) perciò per l'acquisto è necessario essere in possesso del relativo patentino che autorizza l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici o nocivi (D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, art 25). Per informazioni chiamare gli uffici competenti delle provincie.

Il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con ERSa e finanziato dalla legge regionale 5 del 2006 SISSAR lettera C 2. Le sostanze attive indicate nel presente avvertimento rispettano quanto previsto dalle prescrizioni riportate nelle Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti del "Disciplinare Produzione Integrata FVG - Anno 2011" emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.