



CONSORZIO TUTELA VINI DOC FRIULI ISONZO

Servizio di Lotta Integrata, Sperimentazione e Innovazione vitivinicola

VIGNETI A CONDUZIONE INTEGRATA

AVVISO N.7

(avviso del 07 giugno 2011)

LOTTA CONTRO SCAPHOIDEUS TITANUS, TIGNOLE E ALTRI FITOFAGI DELLA VITE

L'emergenza legata all'epidemia di FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE, che sta interessando molte zone viticole del nord Italia, ha imposto in ambito nazionale l'adozione di provvedimenti di lotta obbligatoria intesi ad arginare la malattia.

Nella nostra regione questa pericolosa fitoplasmosi è presente nelle province di Pordenone, Udine e dall'anno scorso anche nel comune di San Canzian d'Is. (GO).

Nel 2008 nel territorio del comune di San Canzian d'Is., vi era l'obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, di:

- eliminare tempestivamente ogni vite con sintomi sospetti di FD, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche sulle singole piante oggetto di epurazione;
- estirpare l'intero appezzamento vitato – intendendo per questo una superficie continua coltivata a vite, omogenea per conduzione, vitigno ed età – qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale.

L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate avverrà d'iniziativa propria del viticoltore o sulla base dell'esito di ispezione effettuata da tecnici a ciò incaricati dal Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione dell'ERSA.

SITUAZIONE GENERALE: lo *Scaphoideus titanus* ha raggiunto il 3° stadio di sviluppo (ninfa), potenzialmente infettivo e in grado di trasmettere la malattia.

STRATEGIE DI DIFESA: La lotta contro *S.titanus* può essere abbinata a quella contro le tignole della vite e contro altri fitofagi, quali le cicaline.

In base al monitoraggio dei voli delle tignole, allo stadio fenologico della cicalina *S. titanus*, si consiglia di intervenire **entro Venerdì 10 giugno** con i seguenti p.a.:

- **IGR:** regolatori della crescita Flufenoxuron (es. Cascade), attivo su tignole, cicalina verde, cicalina gialla e *Scaphoideus titanus*, alla dose di 150 g/HL (1,5 L/Ha), e Indoxacarb (es. Steward) , attivo sia su uova, sia su larve ma non su adulti, alla dose di 15 g/HL (150 g/Ha).

Si raccomanda di bagnare bene la vegetazione, con elevati volumi d'acqua avendo cura di irrorare eventuali polloni.

Si rimanda ad un altro Avviso, il trattamento con i seguenti p.a.:

- **Bacillus Thuringensis;**
- **Esteri fosforici:** Clorpirifos etile, attivo su tignole, cicaline e *Scaphoideus t.*
- **Piretrine naturali** (utilizzabili anche in viticoltura Biologica) non addizionate di piperonil butossido, trattamento replicato a 7 gg.

È consigliabile, negli anni, alternare gli insetticidi.

La lotta al vettore della Flavescenza dorata rimane un'inderogabile priorità e deve essere assolutamente effettuata!

Il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con ERSA e finanziato dalla legge regionale 5 del 2006 SISSAR lettera C2.

Per informazioni o richieste di sopralluoghi contattare il tecnico **CORBATTO MONICA** telefonando ai numeri: 0481 61833 ufficio - 340-5050014, oppure inviare una mail all'indirizzo assistentatecnica@vinidocisonzo.it.