

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO *Scaphoideus titanus* VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Comunicazione n. 01 del 11/06/2013

Situazione

Dai monitoraggi effettuati sul territorio regionale, i primi individui giovanili sono stati osservati nei primi giorni di maggio.

Fino alla scorsa settimana in quasi tutti i vigneti monitorati sono stati catturati solo individui di 1^a età, mentre in un solo vigneto sono stati catturati individui di 2^a.

Nella stessa località l'ultimo monitoraggio ha evidenziato i primi individui del 3^o stadio.

Nelle tabelle seguenti vengono

BAGNARIA ARSA (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
10/05/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2013	98,81	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2013	93,65	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2013	74,61	22,80	2,59	0,00	0,00	0,00

COSEANO - CISTERNA (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
04/06/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CORDENONS (PN)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
28/05/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GORIZIA - OSLAVIA (GO)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
05/06/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SGONICO - SAGRADO (TS)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
05/06/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POVOLETTO - SAVORGNANO DEL TORRE (UD)						
data	% di forme mobili per stadio di sviluppo					
	I	II	III	IV	V	Adulti
05/06/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicazioni per i trattamenti

Dalle osservazioni sulla fenologia dell'insetto, e precisamente sulla percentuale stimata dei diversi stadi giovanili nelle popolazioni, si possono trarre indicazioni utili per il posizionamento degli interventi insetticidi.

Dalle osservazioni finora effettuate si può presumere che il momento più opportuno per intervenire con prodotti regolatori di crescita o comunque attivi solo sugli stadi giovanili (buprofezin, indoxacarb) ricada nella maggior parte della regione nella prossima settimana, dal 17 al 23 giugno.

Dopo tale data, l'impiego di tali sostanze attive deve essere evitato, perché non garantirà un controllo soddisfacente.

In ogni caso gli interventi devono essere eseguiti dopo la fine della fase della fioritura.

Prossimamente, dopo gli aggiornamenti degli ultimi monitoraggi, verranno fornite indicazioni più precise.